

Afrocarpus (Rutye)

čeleď: Podocarpaceae

Roste v lesích východní a jižní Afriky, dále Indického Oceánu a Madagaskaru v podobě stálezeleného zpravidla 2domého stromu nebo keře. Samičí exempláře mají velká nahá semena na slabých stopkách.

V mládí vyžadují chráněné místo s vysokou vzdušnou vlhkostí a hlubokou půdou bohatou na živiny.

Množí se semeny nebo řízkováním.

Afrocarpus dawei

synonyma: *A. mannii* subsp. *dawei*, *Nageia mannii* var. *dawei*, *Podocarpus dawei*, *Podocarpus usambarensis* var. *dawei*

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Keňa, Tanzánie, Uganda

Pochází z Keni, Tanzánie, Ugandy a Konga.

Afrocarpus falcatus (Rutye srpatá)

synonyma: *A. falcatus* subsp. *gaussenii*, *A. gaussenii*, *Decussocarpus falcatus*, *Nageia falcata*, *Nageia falcata* var. *gaussenii*, *Nageia meyeriana*, *Podocarpus falcatus*, *Podocarpus gaussenii*, *Podocarpus gracillimus*, *Podocarpus meyerianus*, *Taxus falcata*

oblasti: Limpopo, Malawi, Mosambik, Svazijsko, Západní Kapsko

Pochází z jižní Afriky. Patří mezi stálezelené dvoudomé stromy s hustou korunou. Dorůstá výšky 10 - 25 (při pobřeží) 45 (vyšší polohy) (i 60)m při průměru kmene 1,8 - 2 (i 3)m. Borka je hnědošedá až načervenalá a odlupuje se v plátcích. Listy vyrůstají ve spirále, jsou úzké, špičaté, zelené nebo nažloutlé, ochlupené, kožovité, mírně voskovité, dlouhé 3,5 - 4,5 (i 5)cm a široké 6mm. Samčí šištice jsou hnědé, mají délku 0,5 - 1,5cm, šířku 3mm, samičí šištice vytvářejí tmavě zelená voskovitá semena o velikosti 1 - 1,8 (i 2)cm.

Afrocarpus gaussenii

oblasti: V Madagaskar

Pochází z východního Madagaskaru.

Afrocarpus gracilior (Rutye křovitá)

synonyma: *A. falcatus* subsp. *gracilior*, *Decussocarpus gracilior*, *Nageia falcata* var. *gracilior*, *Podocarpus gracilior*

oblasti: Etiopie, Keňa, Tanzánie, Uganda

Pochází z Etiopie, Keni, Tanzánie a Ugandy. Dorůstá výšky 20 - 40m při průměru přímého kmene 50 - 80cm. Borka je hladká a načervenalá. Listy vyrůstají ve spirále, jsou kopinaté, špičaté, dospělé

dlouhé 2 - 6cm, široké 3 - 5mm, mladé dlouhé do 10cm a široké 6mm. Samičí šištice mají průměr 2cm a semena jsou voskovitá a růžovofialová.

Afrocarpus mannii (Rutye Mannova)

synonyma: *Decussocarpus mannii*, *Nageia mannii*, *Podocarpus mannii*

oblasti: Tropická Afrika

Pochází z ostrova Svatý Tomáš v Guinejském zálivu. Patří mezi stálezelné rostliny. Dorůstá výšky 10 - 15m. Listy vyrůstají ve spirále, jsou kopinaté, v dospělosti dlouhé 6 - 8cm, na mladých rostlinách dlouhé až 15cm a široké 2cm. Samičí rostliny mají průměr 2cm.

Afrocarpus usambarensis

synonyma: *A. mannii* subsp. *usambarensis*, *Nageia mannii* var. *usambarensis*, *Podocarpus usambarensis*

oblasti: Burundi, Demokratická Republika Kongo (Zair), Rwanda, Tanzánie

Pochází z Burundi, Rwandy, Konga, Tanzánie.

<https://www.rostliny.net/>