

Sorbaria (Tavolníkovec)

čeleď: Rosaceae

Existuje 9 druhů. Po talovínu se jmenuje díky podobnosti květů. Dorůstá výšky 1 - 4m. Nejznámějším druhem je *S. sorbifolia*. Větve jsou doširoka rozložené. Opadavé listy vyrůstají vstřícně, mají zubatý okraj a výraznou žilnatinu. Kvete drobnými bílými květy v latách.

Nemá specifické požadavky na půdu a roste jak na slunci, tak v polostínu.

Množí se podzemními výběžky.

Sorbaria aitchisonii (Tavolníkovec Aitchisonův)

Sorbaria arborea (Tavolníkovec stromovitý)

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *glabrata*
- var. *subtomentosa*

Sorbaria assurgens (Tavolníkovec vystoupavý)

Listy jsou zpeřené, vlastní lístky dlouze vejčité, ostře špičaté, zelené, jemně vroubkované a žilnatina je hustá, mírně propadlá. Květenstvím je terminální kuželovitá lata z drobných bílých kvítků.

Sorbaria grandiflora (Tavolníkovec velkokvětý)

Sorbaria kirilowii (Tavolníkovec Kirilovův)

oblasti: Oregon, Washington

Sorbaria sorbifolia (Tavolníkovec jeřábolistý)

oblasti: Aljaška, Connecticut, Heilongjiang, Indiana, Iowa, J Sibiř, Japonsko, Jilin, Korea, Liaoning, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Střední Asie, Tennessee, Vermont, Virginie, Vnitřní Mongolsko, Washington, Wisconsin, Yukon, Západní Virginie

Roste v Koreji, Japonsku, Číně a Sibiři v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky (1 -) 1,5 - 2,5 (i 3)m. Kmínky jsou vzpřímené a hnědé. Větve jsou v mládí ochlupené, pupeny vejčité a růžovofialovo

hnědé. Vytváří palisty. Listy jsou střídavé, lichozpeřené, tvořené (5 -) 6 -10 (i 12)ti páry, dlouhé 15 - 30cm, vlastní lístky jsou kopinaté, 2x pilovité, dlouhé 3 - 10cm a spodní strana je ochlupená. Květenstvím je vzpřímená lata délky 10 - 35cm, vlastní květy jsou bílé a průměru (0,6 -) 0,7 - 1,1cm. Plodem je ochlupený protáhlý měchýřek délky 4 - 6mm obsahující mnoho semen. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Sem' - až 25cm květní lata, kompaktnější, výška 0,7m
- var. stellipila

Není náročný na půdu ani místo, ale ideální je mírně vlhká půda bohatá na živiny na plném slunci až stínu. Měl by odolávat teplotám do -45°C. Dobře snáší znečištěné prostředí.

Množí se podzemními výběžky

Sorbaria tomentosa

Dorůstá výšky 6m s větvemi rostoucími do široka. Délka květů je až 40cm.

Je odolný na sucho.

Další informace:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sorbaria_tomentosa

<http://www.garten.cz/a/cz/3836-sorbaria-sorbifolia-sem-tavolnikovec-jerabolisty/>

<https://www.rostliny.net/>