

Sorbaria sorbifolia (Tavolníkovec jeřábolistý)

čeleď: Rosaceae

oblasti: Aljaška, Connecticut, Heilongjiang, Indiana, Iowa, J Sibiř, Japonsko, Jilin, Korea, Liaoning, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Střední Asie, Tennessee, Vermont, Virginie, Vnitřní Mongolsko, Washington, Wisconsin, Yukon, Západní Virginie

Roste v Koreji, Japonsku, Číně a Sibiři v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky (1 -) 1,5 - 2,5 (i 3)m. Kmínky jsou vzpřímené a hnědé. Větve jsou v mládí ochlupené, pupeny vejčité a růžovofialovo hnědé. Vytváří palisty. Listy jsou střídavé, lichozpeřené, tvořené (5 -) 6 -10 (i 12)ti páry, dlouhé 15 - 30cm, vlastní lístky jsou kopinaté, 2x pilovité, dlouhé 3 - 10cm a spodní strana je ochlupená. Květenstvím je vzpřímená lata délky 10 - 35cm, vlastní květy jsou bílé a průměru (0,6 -) 0,7 - 1,1cm. Plodem je ochlupený protáhlý měchýřek délky 4 - 6mm obsahující mnoho semen. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Sem' - až 25cm květní lata, kompaktnější, výška 0,7m
- var. stellipila

Není náročný na půdu ani místo, ale ideální je mírně vlhká půda bohatá na živiny na plném slunci až stínu. Měl by odolávat teplotám do -45°C. Dobře snáší znečištěné prostředí.

Množí se podzemními výběžky

<https://www.rostliny.net/>