

Carpinus kawakamii

synonyma: *Carpinus hogoensis*, *Carpinus sekii*

čeleď: Betulaceae

oblasti: Fujian, Tchaj-wan

Roste v Číně v podobě stromu. Borka je tmavěšedá. Větve jsou v mládí hnědé a mohou být řídce ochlupené. Listy jsou kopinaté, symetricky 2x pilovité, špičaté až ocasovité, dlouhé 4 - 5cm, široké 1,8 - 2,5cm, báze zakulacená až prakticky srdčitá, žilnatinu tvoří 10 - 15 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1,5cm. Samičí květenství je dlouhé 4 - 6cm, široké 2 - 2,5cm, má 1cm stopku, listeny délky 1,8 - 2cm, oříšky vejčité a dlouhé 3mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *minutiserrata*/C. *minutiserrata* - Tchaj-wan; borka tmavěšedá; větve v mládí narůžovofialověohnědé; listy mírně kopinaté až mírně vejčité, 2x hustě drobně pilovité, špičaté, dlouhé 6 - 11cm, široké 2,5cm, na spodní straně podél žilek ochlupené, báze prakticky srdčitá až téměř zakulacená, žilnatinu tvoří 15 - 17 párů žilek, řapíky dlouhé 7mm; samičí květenství dlouhé 3 - 4cm na 1,5cm stopce, listeny dlouhé 1,3 - 1,4cm, široké 6 - 7mm; plodem je vejčitý oříšek délky 3mm a šířky 2mm

<https://www.rostliny.net/>