

Eriogonum arcuatum

synonyma: *Eriogonum bakeri*, *Eriogonum crassifolium* var. *tectum*, *Eriogonum flavum* var. *tectum*, *Eriogonum flavum* var. *vegetius*, *Eriogonum jamesii* subsp. *bakeri*, *Eriogonum jamesii* subsp. *flavescens*, *Eriogonum jamesii* var. *arcuatum*, *Eriogonum jamesii* var. *flavescens*, *Eriogonum vegetius*

čeleď: Polygonaceae

oblasti: Arizona, Kolorado, Nové Mexiko, Utah, Wyoming

Roste v USA v kobercových porostech. Dorůstá výšky 2 - 25cm. Listy jsou obkopinaté až eliptické, dlouhé 1 - 3cm, na spodní straně hustě plstnaté, řapíkaté. Květenství okoličnaté se žlutými květy, listenů 3 - 8, úzce eliptické, zákrov zvonkovité. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *ruplicola*/*E. jamesii* var. *ruplicola* - Utah; hustý; listy eliptické, dlouhé 0,5 - 1,2cm; květenství hlávkovité, vzácně okoličnaté, listeny dlouhé 0,3 - 1cm, zákrov velikosti 3 - 5mm, květy dlouhé 4 - 5mm

- var. *xanthum*/*E. xanthum*/*E. flavum* var. *xanthum*/*E. jamesii* var. *xanthum* - Kolorado; výška 2 - 8cm; hustý; listy obkopinaté až podlouhlé, dlouhé 1 - 2,5cm; květenství hlávkovité, obvykle redukované na 1 zákrov, listeny dlouhé 0,3 - 1cm, zákrov velké 4 - 6mm, květy žluté, dlouhé 6 - 7mm

Vyhovují mu chudé písčité půdy a plné slunce.

Množí se semeny nebo řízky.

<https://www.rostliny.net/>