

Eriogonum fasciculatum

synonyma: *E. subsp. aspalathoides*, *E. subsp. aspathaloides*, *E. subsp. foliolosum*, *E. subsp. polifolium*, *E. subsp. typicum*, *E. var. aspalathoides*, *E. var. ericifolium*, *E. var. maritimum*, *E. var. oleifolium*, *Eriogonum rosmarinifolium*, *Eriogonum rosmarinifolium* var. *foliolosum*

čeleď: Polygonaceae

oblasti: Arizona, Kalifornie, Mexiko, Nevada, Utah

Roste v USA a Mexiku v podobě nízkého rozkladitého okrouhlého (někdy i poléhavého) keře. Dorůstá výšky 1 - 1,5m a šířky 2 - 4m. Povrch je plstnatý, vločkovitý nebo i holý, kmínky jsou rozkladité až vzpřímené, obvykle s vytrvávajícími zbytky listů, kmínky jsou plstnaté až holé. Z 1 uzliny vyrůstá 1 list nebo svazeček, tvar je čárkovitý až čárkovitě obkopinatý nebo obkopinatý, délky 0,6 - 1,8cm, šířka 0,5 - 6mm, povrch na spodní straně bíle plstnatý až holý, horní strana plstnatá, naředlá až holá, zelená, okraj bývá podvinutý. Květenství je vrcholičnaté, někdy vrcholičnatě okoličnaté, kompaktní až otevřené, dlouhé 1 - 20cm, široké 1 - 15cm, plstnaté až holé, listeny bývají 3, šupinovitě až 3úhlé nebo listovité, čárkovité až obkopinaté, dlouhé 0,3 - 1cm, široké 1 - 3mm, zákrov obkruželovitá či zvonkovitá, dlouhý 2 - 4mm, široký 1,5 - 3mm, ochlupený až holý, s 5ti zuby délky 0,3 - 1,2mm, květy velikosti 2,5 - 3mm, bílé, růžové, holé nebo ochlupené, korunní lístky bývají eliptické až obvejčité. Plodem je hnědá holá 1,8 - 2,5mm nažka. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Dana Point' - nízký rychle rostoucí habitus s tmavě zelenými listy

- var. *fasciculatum*/subsp. *aspalathoides* - Kalifornie, Mexiko; rozkladitý až poléhavý keř nebo polokeř; výška 10 - 50cm, šířka 0,5 - 3m; povrch naředlý, holý; listy čárkovité až čárkovitě obkopinaté, dlouhé 0,6 - 1,2cm, široké 0,5 - 4mm, spodní strana mírně bíle plstnatá, horní zelená, holá, okraj podvinutý; květenství hlávkovitě, někdy vrcholičnaté, větve holé, zákrov úzce obkruželovitý, délka 3 - 4mm, šířka 1,5 - 2mm, povrch holý nebo téměř holý

- var. *flavoviride*/subsp. *flavoviride* - keře nebo polokeře, okrouhlé, mírně kompaktní; dlouhé 20 - 50cm, široké 0,3 - 1m; povrch mírně vločkovitý nebo holý, žlutozelený; čepel čárkovitá nebo čárkovitě obkopinatá, dlouhá 6 - 10cm, široká 0,5 - 2mm, spodní strana mírně plstnatá až téměř holá, nazelenalá, horní téměř holá až holá, zelená, okraj podvinutý; květenství bývá hlávkovitě, větve holé, zákrov obkruželovitě zvonkovitý, dlouhý i široký 2 - 3mm, olýsalý

- var. *foliolosum*/subsp. *foliolosum*/var. *obtusiflorum*/*E. rosmarinifolium* var. *foliolosum* - Kalifornie, Mexiko; okrouhlé až vzpřímené keře; výška 0,6 - 1,5m, šířka 0,8 - 2,5m; listy čárkovitě obkopinaté až obkopinaté, dlouhé 0,6 - 1,2cm, široké 1 - 4mm, spodní strana bíle plstnatá, horní řídce plstnatá nebo zelená, vločkovitá, okraj rovný, obvykle podvinutý; květenství otevřené, většinou vrcholičnaté, větve mírně plstnaté nebo holé; zákrov obkruželovitý, dlouhý 3- 4mm, široký 1,5 - 2,5mm

- var. *polifolium*/var. *revolutum*/*E. polifolium* - USA, Mexiko; kompaktní až rozkladité keře nebo polokeře; výška 20 - 80cm, šířka 0,2 - 3m; kmínky plstnaté, naředlé, kvetoucí plstnaté (i holé); listy bývají obkopinaté, dlouhé 6 - 18cm, široké 1 - 6cm, z obou stran hustě šedě plstnaté, spodní více, okraj rovný nebo podvinutý; květenství s plstnatými větvemi (vzácně holé), zákrov obkruželovitě zvonkovitý až zvonkovitý, délky 2,5 - 3,5mm, šířky 2 - 3mm

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

<https://www.rostliny.net/>