

Eriogonum heracleoides

synonyma: Eriogonum angustifolium, Eriogonum gyrophyllum, E. subsp. angustifolium, E. var. angustifolium, E. var. micranthum, E. var. minus, E. var. multiceps, E. var. rydbergii, E. var. viride, Eriogonum umbellatum

čeleď: Polygonaceae

oblasti: Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Roste na západě Severní Ameriky v kobercových porostech. Dorůstá výšky 10 - 60cm. Listy jsou ochlupené, čárkovité až čárkovitě kopinaté, špičaté, z obou stran šedivé. Kvete bílými nebo okrově žlutými květy v přeslenech listů ve složeném okolíku. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. leucophaeum/E. caespitosum subsp. ramosum - Idaho, Washington; výška 10 - 15cm; listy bývají úzce obkopinaté, dlouhé 1 - 3cm, z obou stran hustě ochlupené až plstnaté; zákrovy zvonkovité, květy bělavé až okrové, dlouhé 6 - 9mm

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

<https://www.rostliny.net/>