

Encelia

čeleď: Asteraceae

Roste na jihozápadě USA, v Mexiku, Peru, Čile a Galapágách v podobě nízkého větveného keře nebo trvalky. Kvete v samostatných úborech nebo v latách žlutými květy (terčové mohou být i růžovofialové).

Vyhovuje mu plné slunce a dobře propustná písčitá půda. Dobře snáší řez.

Množí se semeny.

Encelia asperifolia

synonyma: *E. californica* var. *asperifolia*

Encelia californica

synonyma: *E. conspersa*

oblasti: Kalifornie

Pochází z Kalifornie. Roste v podobě polokeře v trsech. Dorůstá výšky 0,5 - 1,5m. Listy jsou dlouhé do 6cm, tvaru kopinatého až vejčitého se špičkou, zelené, ochlupené. Kvete samostatnými květy v úborech, korunní lístky dlouhé 1 - 3cm, je jich 15 - 25ks, terčové jsou růžovofialové. Plodem je 5 - 7mm nažka bez chmýru.

Encelia canescens

synonyma: *Coreopsis limensis*, *E. alternifolia*, *E. canescens* var. *oblongifolia*, *E. canescens* var. *tomentosa*, *E. limensis*, *E. oblongifolia*, *E. tomentosa*

oblasti: Čile, Peru

Pochází z Peru. Roste v podobě polokeře. Dorůstá výšky až 50cm. Listy jsou dlouhé až 7cm, široce vejčité, tupé, celokrajné šedě ochlupené. Kvete samostatnými květy nebo po několika ks, kvítky jsou oranžové.

Encelia conspersa

Encelia densifolia

synonyma: *E. densifolia*

Encelia farinosa

synonyma: *E. farinosa* f. *phenicodonta*, *E. farinosa* var. *phenicodonta*, *E. farinosa* var. *radians*, *E. radians*

oblasti: Arizona, Havajské ostrovy, Kalifornie, Nevada, SZ Mexiko, Utah

Roste v USA a Mexiku v podobě okrouhlého keře. Dorůstá výšky (0,05 -) 0,3 - 1 (i 1,5)m. Listy jsou úzce až široce vejčité, dlouhé 3 - 8cm, okraj je celokrajný nebo zubatý, povrch stříbřitě plstnatý. Kvete v úbořech samostatnými květy nebo po několika ks ve vrcholících. Stopky v době plodu bývají převislé. Terčové květy jsou žluté, terč široký 3 - 3,5cm. Vydává příjemné aroma. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *farinosa*
- var. *phenicodonta*
- var. *radians*

Encelia frutescens

synonyma: *E. frutescens* f. *ovata*, *E. frutescens* subsp. *glandulosa*, *Simsia frutescens*

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada

Pochází z USA. Roste v podobě okrouhlého bohatě větveného keře. Dorůstá výšky až 1,5m. Listy jsou dlouhé do 2cm, tvaru kopinatě podlouhlého až vejčitého, báze je uťatá, okraj celokrajný nebo s 1 párem zubů u báze. Kvete samostatnými květy v úbořech na dlouhých stopkách, terčové kvítky jsou žluté. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *frutescens*
- subsp. *glandulosa*

Encelia halimifolia

Encelia hispida

oblasti: Galapágy

Pochází z Galapág. Roste v podobě bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 1m. Mladé větve jsou našedle ochlupené. Listy jsou střídavé, jednoduché, kopinatěvejčité, mírně eliptické, dlouhé 1 - 5cm, z obou stran šedě ochlupené, celokrajné. Kvete v paprscitých úbořech s terčem o šířce 1cm, terčové kvítky jsou narůžovofialové, oboupohlavné, okvětní lístky žluté. Plodem je 4 - 5mm nažka.

Encelia laciniata

Encelia nutans

synonyma: *Enceliopsis nutans*

oblasti: Kolorado, Utah

Roste na jihozápadě USA v trsech. Dorůstá výšky 10 - 25cm. Povrch je zelený, drsně mrtnatý. Stonky jsou pružné. Listy jsou přízemní, okrouhlé až 3úhlevejčité nebo eliptické, dlouhé 2 - 7cm. Kvete bleděžlutými květy v úborech o šířce 2 - 3,5cm.

Vyhovuje mu chudá písčité dobře propustná půda a plné slunce.

Množí se semeny nebo řízky.

Encelia palmeri

Encelia pilocarpa

Encelia pilosiflora

Encelia ravenii

Encelia resinifera

synonyma: *E. frutescens* f. *radiata*, *E. frutescens* var. *resinosa*, *E. resinifera* subsp. *tenuifolia*

oblasti: Arizona, Utah

Roste v podobě keře na jihozápadě USA. Dorůstá výšky 0,4 - 1,5m. Listy jsou dlouhé 1 - 2,5cm, oválné nebo kopinaté, zašpičatělé. Kvete žlutými květy v úboru s 8 - 13ti okvětními lístky. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *resinifera*

- subsp. *tenuifolia* - listy i okvětní lístky jsou více než 3x delší než širší

Encelia scaposa

synonyma: *E. lineariloba*, *E. scaposa* var. *stenophylla*, *Simsia scaposa*

oblasti: Nové Mexiko, Texas

Encelia stenophylla

Encelia ventorum

Encelia virginensis

synonyma: *E. frutescens* f. *virginensis*, *E. frutescens* var. *virginensis*

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada, Nové Mexiko, Utah

Pochází z jihozápadu USA, částečně i z Mohavské pouště. Roste v podobě bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 0,5 - 1,5m. V mládí jsou větve ochlupené. Květy mají 11 - 21 okvětních lístků žluté barvy. Plodem je 5 - 8mm nažka obvykle bez chmýru. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *actonii*/E. *actonii* - Kalifornie, Nevada; výška do 1,5m; listy oválné až 3úhlé, dlouhé několik cm, povrch šedozeleně ochlupený; 25 okvětních lístků; plodem je nažka délky 0,5cm, obvykle bez chmýru

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1783>

<http://www.kadel.cz/skalnicky/t/kvResult.asp-Rod=Encelia.htm>

<https://www.rostliny.net/>