

Asterohyptis

čeleď: Lamiaceae

Asterohyptis mociniana

synonyma: *Hyptis alopecuroides*, *Hyptis biolleyi*, *Hyptis mociniana*, *Hyptis stellulata* var. *sinclairi*, *Mesosphaerum alopecuroides*, *Mesosphaerum biolleyi*, *Mesosphaerum mocinianum*

oblasti: Guatemala, Honduras, J Mexiko, Kostarika, Salvador, Střední Mexiko

Roste od středního Mexika po střední Ameriku v podobě štíhlého vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 1 - 3m. Větve bývají klkenuté nebo zakřivené, hustě krátce odstále ochlupené. Listy jsou blanité štíhle řapíkaté, vejčité nebo kopinatě vejčité, špičaté, báze zaoblená až téměř uťatá, okraj nepravidelně vroubkovaný, obě strany jemně měkce ochlupené a celková délka je 3 - 8cm. Kvete malými bílými květy v hustých bohatých lichopřeslenech tvořících husté přetrhované klasy, kališní trubka má velikost 1,2 - 1,5mm, je hustě ochlupená, zuby velké 2,5 - 3,5mm, jsou rozložené až zakřivené, čárkovitě šídlovité, korunní trubka je dlouhá 3mm.

Asterohyptis nayarana

Asterohyptis seemannii

synonyma: *Hyptis seemannii*, *Hyptis seemannii* var. *stenophylla*

Asterohyptis stellulata

synonyma: *Hyptis pubescens*, *Hyptis punctata*, *Hyptis spinulosa*, *Hyptis stellulata*, *Mesosphaerum pubescens*, *Mesosphaerum spinulosum*, *Mesosphaerum stellulatum*

<https://www.rostliny.net/>