Aconitum napellus

čeleď: Ranunculaceae
oblasti: Altaj, Anglie, Balkánský poloostrov, Connecticut, Česká republika, Irsko, Itálie, J Karpaty, JZ Rusko, Katalánsko, Kazachstán, Korsika, Maine, Michigan, Minnesota, Německo, New Hampshire, New York, Ontario, Pennsylvania, Pyreneje, Quebec, Rakousko, V Alpy, V Evropa, Vermont, Wisconsin, Z Evropa

Roste v západní Evropě a Alpách jako trvalka. Dorůstá výšky 0,3 - 1,3 (i 2)m. Lodyhy jsou vzpřímené. Listy jsou dlanité, 5 - 7midílné několikanásobně laločnaté a laloky jsou úzké. Kvete v 10 - 30cm hroznu s krátkými větvemi s modrofialovými květy s ochlupenou přilbou. Plodem je měchýřek. Je prudce jedovatý, je dokonce nejjedovatější rostlinou Evropy. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. napellus - jihozápadní Anglie
- subsp. corsicum - Korsika
- subsp. firmum - střední a východní Evropa
- subsp. fissurae - Balkán a jihozápadní Rusko
- subsp. hians - střední Evropa
- subsp. lusitanicum - jihozápadní Evropa
- subsp. neomantanum
- subsp. superbum - západní Balkán
- subsp. tauricum - východní Alpy, jižní Karpaty
- subsp. vulgare - Alpy, Pyreneje

Vyhovuje mu stín, vlhčí půda v horských loukách, bažinných lesích, březích potoků, pastvin, atp. Má rád vápno. Jed rostlina využívá k přežití ve vyšších plohách.

https://www.rostliny.net/