

Retrophyllum

čeleď: Podocarpaceae

Listy jsou vstřícné.

Retrophyllum comptonii

synonyma: Decussocarpus comptonii, Nageia comptonii, Podocarpus comptonii

oblasti: Nová Kaledonie

Patří mezi endemity Nové Kaledonie. Roste v podobě stromu. Dorůstá výšky až 30m. Borka je bleděšedá až hnědošedá, vláknitá, na starých stromech drsná a rýhovaná, odlupuje se ve svislých pruzích. Větve jsou v mládí listnaté, vstřícné nebo střídavé, bezlisté s odstálými řídkými šupinami, šupiny jsou kožovité, dlouhé 1 - 2mm u mladých exemplářů, u dospělých až 4mm, podobné malým listům. Listy jsou u mladých exemplářů 2řadé, kopinaté, na spodní straně s nápadným centrálním žebrem, horní mají jemnou rýhu, jsou dlouhé 3cm, široké 6mm, dospělé listy jsou oválně kopinaté, dlouhé 0,6 - 1,5cm, široké 2,5 - 4mm, kožovité. Samčí šištice v paždí listů po 1 - 5ti ks na speciálních větvích nebo na terminálních listnatých. Samičí šištice oválné, dlouhé 0,4 - 1,2cm, široké 2,5 - 3mm, složené ze 2 - 3 odstávajících šupinovitých listenů. Semena jsou kruškovitá až kulovitá, dlouhá 2cm včetně zakřiveného zobáčku, tlusté 1,3 - 1,5cm, mají dužnatý tmavěčervený obal tlustý 2 - 3mm.

Retrophyllum minus

synonyma: Decussocarpus minus, Nageia minor, Podocarpus minor, Podocarpus minus, Podocarpus palustris, R. minor

oblasti: Nová Kaledonie

Patří mezi endemity Nové Kaledonie. Roste v podobě malého stromu. Plody jsou v době zralosti tmavěčervené.

Retrophyllum piresii

synonyma: Decussocarpus piresii, Nageia piresii

oblasti: Brazílie

Patří mezi endemity Brazílie.

Retrophyllum rospigliosii

synonyma: Decussocarpus rospigliosii, Nageia rospigliosii, Podocarpus rospigliosii, Torreya bogotensis

oblasti: Bolívie, Kolumbie, Peru, Venezuela

Roste na západě Venezuely, ve východní Kolumbii, severozápadní Bolívii a středním Peru. Dorůstá výšky až 30m při průměru kmene 0,5 - 0,7 (i 1)m. Listy jsou jednoduché, vzstřícné, čárkovité, oválné až kopinaté, dlouhé 4 - 8mm, široké 2 - 4mm. Květy jsou béžové, dlouhé 1cm. Plody jsou zelené,

dlouhé 3cm a obsahují 1 semeno.

Retrophyllum vitiense

synonyma: *Decussocarpus vitiensis*, *Nageia vitiensis*, *Podocarpus filicifolius*, *Podocarpus vitiensis*

oblasti: Indonésie, Melanésie, Papua-Nová Guinea

Roste na Fidži, Indonésii, Papui-Nové Guineji a Šalamounových ostrovech.

<https://www.rostliny.net/>