

Artemisia absinthium (Pelyněk pravý)

synonyma: Absinthium officinale, Absinthium vulgare, Artemisia absinthia, A. var. insipida, Artemisia arborescens f. rehan, Artemisia arborescens var. cupaniana, Artemisia baldaccii, Artemisia doonense, Artemisia inodora, Artemisia kulbadica, Artemisia pendula, Artemisia rehan, Artemisia rhaetica

čeled': Asteraceae

oblasti: Albánie, Alberta, Altaj, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Ázerbájdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Itálie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, JZ Rusko, Kansas, Katalánsko, Kazachstán, Kolorado, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Makedonie, Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Moldávie, Montana, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Turecko, Ukrajina, Utah, Velká Británie, Vermont, Wisconsin, Wyoming, Z Rusko

Roste v západní Asii, jižní Evropě a severní Africe v podobě trvalky. Roste v podobě rozložitého polokeře v trsu. Dorůstá výšky (0,3 -) 0,4 - 1,2 (i 1,5)m. Listy vyrůstají ve spirále, jsou šedozelené se spodní bělavou stranou, 1 - 2x peřenosečné, přízemní dorůstají délky 25cm, výše postavené mají délku 5 - 10cm, přízemní mají řapíky délky do 10cm, čepel široce eliptickou délky 8 - 15cm a šířky 4 - 8cm. Kvete žlutými květy v úboru o průměru (3 -) 4 - 5mm, vnější zákrovní listeny kožovité, vnitřní mají blanitý okraj, zákrov má délku 2,5 - 3,5mm, šířku 3 - 5mm, samičí korunní lístky v počtu 20 - 25ks, délky 1,25mm se 2mi zuby, terčové květy oboupohlavné, zvonkovité, dlouhé 1,5 - 2mm a s 5tízubou korunou. Plodem je nažka bez chmýru. Obsahuje hořčiny podporující trávení. Nesmí jej ale užívat těhotné ženy. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Lambrook Silver' - symetrický habitus

Vyhovují mu okraje cest, suťovitá a štěrkovitá místa s vápníkem. Pro udržení kompaktního tvaru se po odkvětu zastříhávají.

<https://www.rostliny.net/>