

Asclepias curassavica (Klejicha kurasavská)

čeleď: Asclepiadaceae

oblasti: Andalusie, Florida, Havajské ostrovy, Jižní Amerika, Kalifornie, Katalánsko, Louisiana, Mexiko, Pákistán, Portoriko, Tennessee, Texas

Roste v tropické Jižní Americe v podobě stálezeleného polokeře, ale zpravidla se pěstuje jako jednoletka. Dorůstá výšky i šířky 1 - 1,2m. Stonek je naředlý. Listy jsou vstřícné, úzce kopinaté, špičaté, dlouhé (4 -) 5 - 8 (i 16)cm, široké (0,7 -) 1 - 2 (i 4)cm a spodní straně mírně namodralé. Kvete červenooranžovými květy v okolících na koncích větví o průměru 0,8 - 1,2cm na 1 - 2cm stopce, kalich je zelený, má 2 - 3mm dlouhé laloky, korunní lístky jsou červené až červenooranžové, dlouhé 0,4 - 0,7 (i 1)cm a široké 2,8 - 3mm. Plodem jsou párovité úzce doutníkové měchýřky délky 5 - 10 (i 15)cm, šířky 0,6 - 1cm a obsahuje semena velikosti 4 - 6mm s bílým chocholem chloupků. Je velmi jedovatá.

Nesnází teploty pod 10°C.

<https://www.rostliny.net/>