

Lonicera baltica (Zimolez baltský)

synonyma: *Lonicera caerulea* var. *altaica*, *Lonicera villosa*

čeleď: Caprifoliaceae

oblasti: Skandinávie, Z Rusko

Roste v evropském Rusku a Skandinávii v podobě bohatě větveného keře o výšce 1 - 2m. Borka je tmavá, červenohnědá. Větve jsou v mládí hustě olistěné, bývají tlusté, měkce hustě šedě ochlupené (chlupy 2 typů), pupeny jsou tmavě hnědočervené a hustě krátce ochlupené. Listy jsou obvejčité nebo i eliptické, dlouhé 1,5 - 5 (i 7)cm, široké 0,4 - 2,7cm, tupé nebo téměř tupé, někdy zašpičatělé, báze klínovitá, zelené, spodní strana bledší, v mládí bývají našedlé, zejména na spodní straně, okraj hustě brvitý a řapíky měkce ochlupené, dlouhé 2 - 7mm. Listeny nitkovité, dlouhé 2,5 - 8mm, ochlupené, stopkatě žláznaté, kališní lem mírně rozeklaný, holý nebo na okraji ochlupený, koruna je dlouhá 0,9 - 1,4cm, nálevkovitá, na vnější straně krátce ochlupená (často se žlázkami), laloky vejčité, 2 - 3x delší než trubka. Plodem je kulovitá až eliptická nejedlá hořká bobule délky 0,7 - 1,1cm.

<https://www.rostliny.net/>