

Crepis foetida (Škarda smrdutá)

synonyma: Anisoderis foetida, Arnoseris foetida, Barkhausia candollei, Barkhausia divaricata, Barkhausia echooides, Barkhausia foetida, Barkhausia glanduligera, Barkhausia graveolens, Barkhausia hirta, Barkhausia pinguis, Barkhausia prostrata, Barkhausia rodigioides, Barkhausia schimperi, Barkhausia triangularis, Barkhausia zacinthia, Berinia foetida, Chondrilla decandollei, Crepis amygdalina, Crepis fallax, Crepis foetens, C. subsp. maritima, C. subsp. radicata, C. subsp. zacinthia, Crepis glanduligera, Crepis gracilis, Crepis graveolens, Crepis insularis, Crepis interrupta, Crepis kotschyana, Crepis radiata, Crepis radicata, Crepis rodigioides, Crepis schimperi, Crepis thracia, Crepis zacinthia, Hieraciodes schimperi

čeleď: Asteraceae

oblasti: Andalusie, Česká republika, Gruzie, Írán, Itálie, JV Evropa, Katalánsko, Kavkaz, Massachusetts, Německo, Švýcarsko, Wisconsin

Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 10 - 50cm. Lodyha je ochlupená. Listy jsou ochlupené, kracovitě peřenoklané až 2x peřenosečné. Kvete žlutými květy v úborech (před rozkvětem zpravidla převislé) seskupených do lat na 2 - 7cm stopce, zákrov je zvonkovitý, dlouhý 0,9 - 1,3cm a široký 7 - 9mm. Plodem je nažka, vnější jsou dlouhé 6 - 9mm, mají 12 žeber s krátkým zobákem, vnitřní jsou dlouhé 1 - 1,6cm, mají 20 žeber, dlouhý slabý zobánek a chmýr má délku 4,5 - 7mm. Při mnutí vydává nepříjemný zápach. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. commutata
- subsp. foetida (Škarda smrdutá pravá) - zákrov za květu úzce válcovitě zvonkovitý, 1,5 - 1,8x delší než široký, vnější zákovrní listeny mají délku 1/4 - 1/2 vnitřních, chlupy na vnitřních zákovrních listenech bývají z většiny jemné, kadeřavé, smíšené se žláznatými chlupy bez štětinatých; vápencové skály, pastviny
- subsp. glandulosa
- subsp. rhoeadifolia (Škarda smrdutá mákolistá) - jihovýchodní Evropa a jihozápadní Asie; výška 10 - 50cm; v horní části přisedlé peřenosečné listy; zákrov za květu široce zvonkovitý, 1 - 1,5x delší než široký, vnější zákovrní listeny mají délku 1/2 - 3/4 vnitřních chlupy na vnitřních zákovrních listenech bývají z většiny štětinaté, u báze ztlustlé, s příměsí jemných chlupů, zřídka žláznaté; chráněný druh C3; okraje cest, suché trávníky, vinice

Vyhovují mu okraje cest, násypy, atp.

<https://www.rostliny.net/>