

Silene nutans (Silenka níčí)

synonyma: *Cucubalus nutans*, *Cucubalus quadrifidus*, *Cucubalus rubens*, *Silene brachypoda*, *S. subsp. smithiana*, *S. var. brachypoda*, *S. var. smithiana*

čeleď: Caryophyllaceae

oblasti: Andalusie, Asie, Česká republika, Itálie, Katalánsko, Maine, Michigan, Německo, New York, Ohio, Polsko, Švýcarsko, Velká Británie, Vermont

Roste v Euroasii. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 20 - 60 (i 70)cm. Pod zemí vytváří vícehlavý oddenek. Stonek je ve spodní části krátce ochlupený, v horní části žláznatý. Obvykle nebývá větvený. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou ve spodní části kopistěovité, celkově vejčité, dlouze řapíkaté, výše postavené jsou užší, menší, až čárkovité, žláznatě ochlupené a přisedlé. Kvete bílými převislými květy o délce 1 - 1,5cm ve vidlanech složených do laty, mají žilnatý kalich a občasnými kudrlinky na konci okvětních lístků. Ty jsou kromě toho hluboce dvouklanné. Květy se plně rozvíjejí večer, kdy i intenzívně voní. Plodem je kuželovitá tobolka délky 0,8 - 1cm obsahující ledvinovitá 1mm dlouhá semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *brachypoda*
- subsp. *dubia*
- subsp. *insubrica*
- subsp. *livida*
- subsp. *nutans* (Silenka níčí pravá)

Vyhovují ji teplejší sušší travnatá místa, křoviny, skalky, atp.

<https://www.rostliny.net/>