

Anisacanthus

čeleď: Acanthaceae

Rostou v podobě polokeře nebo keře. Listy jsou vstřícné a celokrajné. Kvete v klasech nebo hroznech, listeny jsou krátce vytrvávající, koruna nálevkovitá a 4laločná. Nejznámějším druhem je *A. wrightii*.

Anisacanthus andersonii

Anisacanthus boliviensis

synonyma: *A. caduciflorus*, *A. cauduciflorus*, *Drejera boliviensis*

oblasti: Bolívie

Anisacanthus brasiliensis

oblasti: Brazílie

Anisacanthus insignis

Anisacanthus junceus

synonyma: *Drejera juncea*

Anisacanthus linearis

synonyma: *A. insignis* var. *linearis*

oblasti: Texas

Anisacanthus malmei

Anisacanthus nicaraguensis

oblasti: Nikaragua

Anisacanthus pohlii

Anisacanthus puberulus

synonyma: *A. insignis*, Drejera puberula

oblasti: Texas

Anisacanthus pumilus

synonyma: *A. greggii*, Drejera greggii

Anisacanthus quadrifidus

synonyma: *A. quadrifidus* var. *brevilobus*, *A. virgularis*, *A. wrightii* var. *brevilobus*, *Justicia quadrifida*, *Justicia virgularis*

oblasti: S Mexiko, Texas

Roste v Texasu a severním Mexiku. Dorůstá výšky až 1,5m. Lisy jsou podlouhlé až kopinaté a dlouhé do 5cm. Kvete červenými až červenorůžovofialovými květy o délce do 3,5cm v latnatých klasech. Opylují jej kolibříci. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *wrightii*

Anisacanthus ramosissimus

synonyma: *Thrysacanthus ramosissimus*

Anisacanthus secundus

Anisacanthus tetracaulis

Anisacanthus thurberi

synonyma: Drejera thurberi

oblasti: Arizona, Nové Mexiko

Anisacanthus trilobus

Anisacanthus tulensis

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1457>

<https://www.rostliny.net/>