

Osmaronia (Vonivka)

čeleď: Rosaceae

Existuje 1 druh.

Osmaronia cerasiformis (Vonivka třešňovitá)

synonyma: *Nuttallia cerasiformis*, *Oemleria cerasiformis*

oblasti: Britská Kolumbie, Kalifornie, Oregon, Washington

Pochází ze západu Severní Ameriky. Roste v podobě vzpřímeného opadavého vícekmenného keře. Dorůstá výšky 2 - 5m. Větve jsou holé a lesklé. Listy jsou podlouhlé až kopinaté či obkopinaté, dlouhé 5 - 10cm, tmavězelené, na spodní straně šedozelené a ochlupené, zašpičatělé a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Kvete dvoudomými 5tičetnými bílými květy s 15ti tyčinkami, o průměru 0,6 - 1cm v krátkých převislých 5 - 10tičetných hroznech. Plodem je modročerná až černá peckovice o délce 1,8cm.

Vyhovuje ji vlhká půda bohatá na živiny na plném slunci nebo polostínu. U starších exemplářů můžeme provádět prosvětlovací řez. Květy jsou náchylné na pozdní mrazíky.

Množí se semeny nebo odkopky.

Další informace:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vonivka_t%C5%99e%C5%A1%C5%88ov%C3%A1

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=514>

<http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/osmaronia-greene-rosaceae-vonivka/>

<https://www.rostliny.net/>