

Gaultheria domingensis

synonyma: *Brossaea bracteata* var. *cordifolia*, *Brossaea coccinea*, *Gaultheria coccinea*, *Gaultheria cordifolia*, *Gaultheria sphagnicola*, *Gaultheria swartzii*

čeleď: Ericaceae

oblasti: Karibik, S Jižní Amerika

Roste v Karibiku a na severu Jižní Ameriky v podobě rozkladitého až vzpřímeného 1/2keře až keře. Dorůstá výšky 10 - 60cm. Větve jsou ochlupené. Listy jsou eliptické, vejčité až prakticky kulaté, zakulacené až zašpičatělé, mohou být mírně podvinuté, mohou být vroubkovaně pilovité, zelené, zejména podél žilek ochlupené, dlouhé 1 - 5,5cm, široké 0,8 - 3cm, báze zakulacená až téměř srdčitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 4mm. Květenství je úžlabní, hroznovité nebo latnaté, 2 - 8mikvěté, vrteno dlouhé 0,4 - 3cm, vlastní květy mají 0,4 - 1cm stopku, kalich délky 5,3 - 7,5mm, cípy jsou kopinaté, zašpičatělé, koruna baňkovitá, růžová až červená, dlouhá 5 - 7mm a laloky jsou mírně zahnuté.

<https://www.rostliny.net/>