

Bursera (Březule)

čeleď: Burseraceae

Roste v tropech a subtropech Ameriky (včetně Galapág), zejména v Mexiku v podobě opadavého keře nebo stromu. Borka se odlupuje. Listy jsou seskupené zejména na koncích větví, jsou střídavé, bývají 1 - 2x zpeřené se 3 či více lístky, okraj celokrajný nebo pilovitý, často průsvitně tečkované. Kvete drobnými bělavými květy v úžlabích latách, kalich je 3 - 6tilaločnatý, korunních lístků má 3 - 6, 6 - 12 tyčinek a 3 - 5tipouzdré semeníky. Plodem je peckovice nebo tobolka vejčitého až téměř kulovitého tvaru s 1 semenem.

Bursera aloexylon

Bursera altijuga

Bursera amplifolia

Bursera angustata

synonyma: *Commiphora angustata*, *Elaphrium angustatum*, *Terebinthus angustata*

Bursera aptera

synonyma: *Elaphrium apterum*, *Terebinthus aptera*

Bursera arida

synonyma: *Elaphrium aridum*, *Terebinthus arida*

Bursera ariensis

synonyma: *Amyris ariensis*, *B. brachypoda*, *B. pannosa*, *B. sessiliflora*, *B. sessiliflora* var. *pubivalvis*, *Elaphrium ariense*, *Elaphrium brachypodium*, *Elaphrium pannosum*, *Elaphrium sessiliflorum*, *Terebinthus pannosa*, *Terebinthus sessiliflora*

Bursera aromatica

Bursera aspleniifolia

synonyma: *Elaphrium aspleniifolium*

Bursera attenuata

synonyma: *Elaphrium acuminatum*, *Elaphrium attenuatum*, *Terebinthus attenuata*

Bursera bicolor

synonyma: *Amyris bicolor*, *Elaphrium bicolor*

Bursera biflora

synonyma: *Elaphrium biflorum*, *Terebinthus biflora*

Bursera bipinnata

synonyma: *Amyris bipinnata*, *B. bipinnata* var. *ovatifolia*, *B. elemifera*, *B. gracilis*, *B. tenuifolia*, *B. verapacensis*, *Elaphrium bipinnatum*, *Elaphrium elemiferum*, *Elaphrium gracile*, *Elemifera bipinnata*, *Terebinthus bipinnata*, *Terebinthus gracilis*

oblasti: Guatemala, Mexiko, Salvador

Roste od Mexika po Salvador v podobě keře i stromu s nízce posazenou rozkladitou hustou korunou. Dorůstá výšky 1,5 - 8m. Kmen je tlustý. Větve mohou být drobně ochlupené. Listy jsou 2 i vícekrát zpeřené, lístky bohaté, kožovité, hustě drobně ochlupené, okrouhle vejčité až čárkovité kopinaté, dlouhé 3 - 7mm a na spodní straně světlé. Květenství bývá menší, chudé, vlastní květy 4dílné. Plodem je zelená nebo červená holá peckovice délky 6mm.

Bursera bolivarii

Bursera bonetii

Bursera brunea

synonyma: *Spondias brunea*

Bursera cerasiifolia

synonyma: *Elaphrium cerasiifolium*

Bursera chemapodicta

Bursera cinerea

synonyma: *B. gummiifera* var. *pubescens*, *Terebinthus cinerea*

Bursera citronella

Bursera collina

synonyma: *Elaphrium collinum*

Bursera confusa

synonyma: *Elaphrium confusum*

Bursera copallifera

synonyma: *Amyris copallifera*, *Amyris jorullensis*, *Amyris lanuginosa*, *Amyris rugosa*, *B. glabrescens*, *B. jorullensis*, *B. lanuginosa*, *B. palmeri* var. *glabrescens*, *Elaphrium copalliferum*, *Elaphrium crenatum*, *Elaphrium cuneatum*, *Elaphrium glabrescens*, *Elaphrium jorullense*, *Elaphrium lanuginosum*, *Terebinthus palmeri*

Bursera coyucensis

Bursera crenata

Bursera cuneata

Bursera delpechiana

Bursera denticulata

Bursera discolor

Bursera diversifolia

synonyma: *Elaphrium diversifolium*, *Terebinthus diversifolia*

oblasti: Guatemala, Mexiko

Roste v Guatemale a Mexiku v podobě keře nebo stromu s rozkladitou korunou. Dorůstá výšky 3,5 - 8m. Větve holé, lesklé, načervenalé a v mládí ochlupené. Listy jsou min. 2x zpeřené, vlastní lístky v 4 - 10ti párech, spodní bývají znovu zpeřené se 3 - 7mi lístky, lístky vejčité až podlouhlé, téměř kožovité, dlouhé 1,5 - 4cm, široké 0,7 - 2cm, hrubě pilovitý, tupé či špičaté, báze zaoblená a spodní strana hustě ochlupená. Kvete 4dílnými květy. Plodem je holá peckovice délky 0,8 - 1cm.

Bursera dubia

Bursera epinnata

synonyma: *B. nesopola*, *Elaphrium epinnatum*

Bursera esparzae

Bursera excelsa

synonyma: *Amyris elegans*, *B. acutidens*, *B. excelsa* var. *acutidens*, *B. excelsa* var. *favionalis*, *B. excelsa* var. *favionalis*, *B. sphaerocarpa*, *Elaphrium excelsum*

oblasti: Guatemala, Mexiko

Roste v Guatemale a Mexiku v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky až 7 - 8m. Borka je tmavá a načervenalá. Větve jsou tlusté a v mládí ochlupené. Listy jsou zpeřené, některé i vícekrát, tvořené 5 - 9ti lístky, vřeteno úzce křídlaté, vlastní lístky lesklé, z obou stran bývají řídce ochlupené, vejčité, dlouhé 2,5 - 5cm, hrubě vroubkované až laločnaté, špičaté nebo tupé a báze mírně zkosená. Kvete v latach 4dílnými květy. Plody jsou téměř kulovité, holé a dlouhé 1cm.

Bursera fagaroides

synonyma: *Amyris fagaroides*, *Amyris ventricosa*, *B. covillei*, *B. fagaroides* f. *bourgeauana*, *B. fagaroides* f. *crenulata*, *B. fagaroides* f. *elliptica*, *B. fagaroides* f. *ramosissima*, *B. fagaroides* var. *elongata*, *B. fagaroides* var. *purpusii*, *B. inaguensis*, *B. lonchophylla*, *B. obovata*, *B. odorata*, *B. purpusii*, *B. schaffneri*, *B. tenuifolia*, *Commiphora inaguensis*, *Elaphrium covillei*, *Elaphrium fagaroides*, *Elaphrium inaguense*, *Elaphrium lonchophyllum*, *Elaphrium obovatum*, *Elaphrium odoratum*, *Elaphrium purpusii*, *Elaphrium schaffneri*, *Elaphrium tenuifolium*, *Terebinthus fagaroides*, *Terebinthus schaffneri*, *Terebinthus tenuifolia*

oblasti: Arizona, J Mexiko

Roste od Arizonky po jižní Mexiko. Borka se odlupuje. Kmen vytváří při bázi ztlustlý kaudex. Při poranění uvolňuje vonné silice. Plody jsou kulaté a obsahují oranžovočervené semeno o velikosti 5mm.

Množí se semeny.

Bursera filicifolia

synonyma: *B. laxiflora* subsp. *filicifolia*, *B. laxiflora* var. *filicifolia*, *Elaphrium filicifolium*

Bursera fragilis

Bursera fragrantissima

Bursera frenningiae

Bursera galeottiana

synonyma: *Elaphrium galeottianum*, *Terebinthus galeottiana*

Bursera glabra

synonyma: *Amyris elaphrium*, *Elaphrium glabrum*

Bursera glabrifolia

synonyma: *B. nelsonii*, *B. schiedeana*, *Elaphrium aloexylon*, *Elaphrium glabrifolium*, *Elaphrium nelsonii*, *Elaphrium schiedeanum*, *Terebinthus aloexylon*, *Terebinthus nelsonii*, *Terebinthus schiedeana*

Bursera glauca

synonyma: *Commiphora glauca*, *Elaphrium glaucum*

Bursera gracilipes

Bursera grandifolia

synonyma: *B. grandifolia* f. *robusta*, *B. occidentalis*, *Elaphrium cinereum*, *Elaphrium grandifolium*, *Elaphrium occidentale*, *Terebinthus grandifolia*

Bursera graveolens

synonyma: *Amyris caranifera*, *Amyris graveolens*, *B. anderssonii*, *B. graveolens* var. *pilosa*, *B. graveolens* var. *pubescens*, *B. graveolens* var. *villosula*, *B. pilosa*, *B. tatamaco*, *Elaphrium graveolens*, *Elaphrium pilosum*, *Spondias edmonstonei*, *Terebinthus graveolens*, *Terebinthus pilosa*

oblasti: Ekvádor, Galapággy, Peru, Venezuela

Roste od Peru po Venezuela v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky 3 - 12m. Větve jsou červenohnědé, občas řídce ochlupené. Listy jsou seskupené na koncích větví, jsou střídavé, řapíky dlouhé 10 - 15cm, v 2. 1/2 úzce křídlaté, zpeřené, tvořené 5 - 7mi lístky, dlouhé 10 - 28cm, vlastní lístky přisedlé, vejčité až podlouhlé, zelené, na okraji pilovité až vroubkované, dlouhé 6cm, široké 3cm a centrální žebro je na spodní straně vyniklé. Kvete jednopohlavnými květy v paždí v latách o délce 10 - 13cm, listeny jsou čárkovitě kopinaté, špičaté, stopky květů dlouhé 5 - 8mm, kalich je holý nebo drobně ochlupený, laloky vejčité, dlouhé do 1mm, korunní lístky 4, podlouhlé, dlouhé 4mm, světlé a žlutobílé. Plodem je vejčitá peckovice velikosti 0,6 - 1,2cm.

Vyhovují ji suché tropické lesy.

Bursera heliae

Bursera heptaphylla

Bursera heteresthes

synonyma: *B. steyermarkii*

Bursera heterophylla

synonyma: *Elaphrium heterophyllum*

Bursera hindsiana

synonyma: *B. goldmanii*, *B. hindsiana* var. *rhoifolia*, *B. macdougalii*, *B. rhoifolia*, *Elaphrium goldmanii*, *Elaphrium hindsianum*, *Elaphrium macdougalii*, *Elaphrium rhoifolium*

oblasti: Kalifornský záliv

Bursera hintonii

Bursera hollickii

synonyma: *Elaphrium hollickii*

Bursera howellii

Bursera icicariba

Bursera infernidialis

Bursera instabilis

Bursera inversa

Bursera isthmica

Bursera itzae

Bursera karsteniana

synonyma: *B. trinitensis*, *Elaphrium trinitense*

Bursera karwinskii

synonyma: *Elaphrium karwinskii*, *Terebinthus karwinskii*

Bursera kerberi

synonyma: *Elaphrium kerberi*, *Terebinthus kerberi*

Bursera klugii

synonyma: *Protium klugii*

oblasti: Peru

Roste v Peru. Větve jsou hustě žlutohnědě drobně ochlupené. Listy mají 4 - 6cm ochlupené řapíky, jsou zpeřené, tvořené 4mi páry lístků, lístky téměř kožovité, matné, eliptické, báze zaoblená, konec ocasovitý, délka 10cm, šířka 3cm, terminální jsou široké 3,5 - 4cm a řapíčky jsou dlouhé 5mm. Květenství je hroznovité, květy jsou dlouhé 2mm, mají 1,5 - 2mm stopky, vejčitý 1mm kalich na vnější straně ochlupený, ochlupené jsou i okvětní lístky a semeníky.

Bursera krusei

Bursera lancifolia

synonyma: *B. trijuga*, *Elaphrium fragile*, *Elaphrium lancifolium*, *Elaphrium trijugum*, *Terebinthus trijuga*

Bursera laurihuertae

Bursera laxiflora

synonyma: *B. concinna*, *Elaphrium concinnum*, *Elaphrium laxiflorum*, *Terebinthus laxiflora*

Bursera leptophloeos

Bursera linanoe

synonyma: *Amyris linaloe*, *Amyris linanoe*, *B. aloexylon*, *B. delpechiana*, *B. longipedunculata*, *Elaphrium longipedunculatum*

Bursera littoralis

Bursera longipes

synonyma: *Elaphrium longipes*, *Terebinthus longipes*

Bursera lunanii

synonyma: *Amyris lunanii*, *B. simplicifolia*, *Elaphrium jamaicense*, *Elaphrium simplicifolium*

Bursera macvaughiana

Bursera madrigalii

Bursera malacophylla

oblasti: Galapággy

Roste na Galapágách v podobě stromu či keře. Dorůstá výšky do 4m. Větve jsou hnědé, načervenalé a vlnatě ochlupené. Listy jsou střídavé, bývají zejména na koncích větví, zpeřené, dlouhé 8 - 15cm, tvořené 5 - 9ti páry lístků lístky vejčité, šedozelené, ochlupené, na okraji vroubkované, dlouhé 6cm a terminální je delší. Kvete jednopohlavnými květy seskupenými do úžlabních lat o délce 9 - 15cm, korunní lístky jsou 4, dlouhé 4mm a žlutobílé. Plodem je 0,8 - 1,3cm dlouhá peckovice.

Bursera martae

Bursera medranoana

Bursera microphylla

synonyma: *Elaphrium microphyllum*, *Terebinthus microphylla*

oblasti: Arizona, Kalifornie, SZ Mexiko

Roste na jihozápadě USA a severozápadě Mexika. Dorůstá výšky do 3m. Větve jsou tmavěčervené. Listy jsou zpeřené, tvořené 13 - 33 lístky, lístky jsou dlouhé do 6mm a čárkovité. Kvete v malých svazečcích bílými 5tičetnými květy.

Bursera mirandae

Bursera morelensis

synonyma: *Elaphrium morelense*

Bursera multifolia

synonyma: *Elaphrium multifolium*, *Terebinthus multifolia*

Bursera multijuga

synonyma: *B. pringlei*, *B. rubra*, *Elaphrium multijugum*, *Elaphrium pringlei*, *Elaphrium rubrum*, *Terebinthus multijuga*, *Terebinthus rubra*

Bursera nashii

synonyma: *Elaphrium nashii*

Bursera occulta

Bursera oerstedii

synonyma: *Elaphrium oerstedii*

Bursera ovalifolia

synonyma: *B. longicuspis*, *Elaphrium ovalifolium*

Bursera ovata

synonyma: *Commiphora ovata*

Bursera palaciosii

Bursera palmeri

synonyma: *B. queretarensis*, *Elaphrium palmeri*, *Elaphrium queretarensis*, *Elaphrium queretarensis*

Bursera panamensis

Bursera paradoxa

Bursera penicillata

synonyma: *Amyris penicillata*, *B. mexicana*, *Elaphrium delpechianum*, *Elaphrium mexicanum*, *Elaphrium penicillatum*, *Terebinthus delpechiana*, *Terebinthus mexicana*

Bursera permollis

oblasti: Guatemala

Patří mezi endemity Guatemale. Roste v podobě stromu. Dorůstá výšky 5m. Větve jsou tlusté, světlé, hustě krátce odstále ochlupené. Listy jsou 3četné, řapíky dlouhé 4 - 5cm, lístky mají 0,3 - 1,2cm řapíky, tvar eliptický až téměř okrouhlý, konec tupý, náhle ocasovitý, báze široce klínovitá, délka 5 - 10cm, šířka 4 - 8,5cm, okraj celokrajiný, horní strana je hustě sametově ochlupená a žilnatina vystouplá. Kvete v paždí v chudokvětých květenstvích, vřeteno je tlusté, krátce ochlupené a i květy mají tlusté krátké stopky. Plodem je hustě krátce ochlupená až holá peckovice délky 1cm obsahující 1 semeno délky 8mm a šířky 6mm.

Bursera pontiveteris

Bursera ribana

Bursera roseana

synonyma: *B. acuminata*, *Terebinthus acuminata*

Bursera rupicola

Bursera rzedowskii

Bursera sarcopoda

Bursera sarukhanii

Bursera schlechtendalii

synonyma: *B. jonesii*, *Elaphrium jonesii*, *Terebinthus jonesii*, *Terebinthus schlechtendalii*

oblasti: Guatemala, J Mexiko

Roste v Guatemale a Mexiku v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 4 - 6m. Borka je lesklá, šedorůžová a odlupuje se v tenkých proužcích. Větve jsou tlusté, tmavě červenohnědé. Listy jsou seskupené k sobě, mají krátké řapíky, čepel obvejčitou, dlouhou 1,5 - 4,5cm, konec zaoblený i vykrojený a báze je klínovitá. Květy mají silné stopky. Plody se objevují na pichlavých větvích, mají tlustou stopku, velikost 5 - 6mm a jsou 3hranné.

Bursera sellowii

Bursera serrata

oblasti: Ásám, Pákistán

Roste v Pakistánu a Indii v podobě stromu. Listy jsou střídavé, zpeřené, lístky jsou malé, mírně kopinaté, mohou být ochlupené, v počtu 7ks i více a mají řapíčky. Květenstvím je lata, vlastní květy jsou drobné, vně ochlupené, mají 5 kališních lístků a 5 korunních lístků.

Bursera shaferi

synonyma: *Elaphrium shaferi*

Bursera silvae

Bursera simaruba (Březule balzámová)

synonyma: *B. arborea*, *B. bonairensis*, *B. gummifera*, *B. gummifera* var. *glabrata*, *B. gummifera* var. *polyphylla*, *B. integrifolia*, *B. simaruba* var. *yucatanensis*, *B. subpubescens*, *Elaphrium arboreum*, *Elaphrium integrifolium*, *Elaphrium simaruba*, *Elaphrium subpubescens*, *Icicaria simaruba*, *Pistacia simaruba*, *Terebinthus arborea*, *Terebinthus simaruba*

oblasti: Belize, Florida, Kostarika, Portoriko, S Brazílie, Střední Mexiko, Venezuela, Yucatán

Roste od Floridy a středního Mexika až po severní Brazílii v podobě obvykle jednodomého stromu. Dorůstá výšky 5 - 25m při průměru kmene 0,4 - 1m. Větve jsou rozkladité, lesklé a červené. Borka se odlupuje v tenkých plátech a má měděčervenou barvu. Listy mohou být ochlupené, dlouhé 10 - 20cm, řapíky dlouhé do 14cm, vyrůstají ve spirále, zpeřené, zpeřené, tvořené 5 - 9ti lístky, lístky vejčité, obvejčité nebo kopinaté, dlouhé 3 - 12 (i 14)cm, široké 3 - 8cm, špičaté, v mládí na spodní straně ochlupené a mají řapíčky. Kvete v holých či ochlupených latach nebo hroznech, jsou dlouhé 5 - 10cm, květy mají 4 - 8mm stopky, samčí jsou 3četné, bílé, samičí 5tičetné, bílé, nažloutlé nebo zelenohnědé, kališní lístky dlouhé 1mm, korunní dlouhé 2 - 3mm a vějčité až kopinaté. Plodem je podlouhlá 3boceeliptická tobolka délky 0,5 - 1 (i 1,5)cm obsahující bílé 3boké aromatické semeno a červenou dužinu.

Vyhovují ji suchá místa, skály, atp. ve vlhkých tropických a subtropických lesích. Snáší i zasolená místa.

Bursera simplex

Bursera spinescens

synonyma: *Commiphora spinescens*

Bursera standleyana

Bursera staphyleoides

Bursera stenophylla

synonyma: *Elaphrium stenophyllum*

Bursera steyermarkii

oblasti: Guatemala

Patří mezi endemity Guatemale. Roste v podobě malého stromu s rozkladitou korunou. Větve jsou červenohnědé a holé. Listy jsou dlouze řapíkaté, 3četné, lístky přisedlé, obvejčité až obkopinaté, velké 4 - 6,5cm, špičaté, téměř k báze vroubkované, báze tupá až klínovitá a povrch je sametově ochlupený. Kvete v chudokvětém volném květenství, stopky květů jsou dlouhé 1cm. Plody jsou holé, obvejčité a dlouhé 1cm.

Bursera submoniliformis

synonyma: *B. subsessiliformis*, *Elaphrium submoniliforme*

Bursera subtrifoliata

synonyma: *Elaphrium subtrifoliatum*, *Terebinthus subtrifoliata*

Bursera suntui

Bursera tecomaca

synonyma: *Elaphrium tecomaca*

Bursera toledoana

Bursera tomentosa

synonyma: *Amyris tomentosa*, *B. tomentosa* var. *pubescens*, *Elaphrium jacquinianum*, *Elaphrium octandrum*, *Elaphrium tomentosum*, *Fagara octandra*, *Terebinthus tomentosa*

Bursera tonkinensis

Bursera trifoliolata

Bursera trimera

Bursera vazquezyanesii

Bursera vejar-vazquezii

Bursera velutina

synonyma: *B. velutina* var. *parvifolia*

Bursera xochipalensis

Bursera xolocotzii

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/cizi/rostlina.php?230>

<http://botany.cz/cs/bursera-simaruba/>

<http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ezule>

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1708>

<http://www.zelenelisty.cz/clanky/werbar---sukulenty/bursera-fagaroides.html>

<https://www.rostliny.net/>