

Eremogone (Stepnatka)

čeleď: Caryophyllaceae

Rostou v Severní Americe, Evropě a Asii v podobě trvalky, často s dřevnatějící bází. Kmínky mohou být poléhavé až vzpřímené. Listy bývají přisedlé, nitkovité až čárkovité. Květenství bývá terminální, někdy bývají květy samostatné, mohou mít stopku, 5 kališních lístků s bílým lemem, korunních lístků je také 5, bývají bílé, nažloutlé, narůžovělé nebo nahnědlé a tyčinek je 10. Plodem je tobolka s 1 - 10ti tmavými semeny.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone aberrans

synonyma: *Arenaria aberrans*

oblasti: Arizona

Roste v USA ve stálezelených trsech. Dorůstá výšky 3 - 23cm. Kmínky jsou vzpřímené a báze dřevnatí. Povrch je žláznatý. Bazální listy jsou jehlicovité, dlouhé 0,8 - 2cm, široké 0,4 - 0,8mm, trnité a lodyžní jsou zakrnělé. Květenství je 1 - 6tičetné, vrcholičnaté, vlastní květy mají 0,6 - 2,5cm stopky, kališní lístky dlouhé 3,5 - 4mm, korunní lístky nažloutlé a dlouhé 0,6 - 1cm. Plodem je holá tobolka délky 0,7 - 1cm obsahující tmavá zakulacená hnědočerná hrbolkatá semena délky 2 - 2,4mm.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone acerosa

synonyma: *Arenaria acerosa*, *Arenaria acerosa* var. *glabra*

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku. Listy jsou seskupené k sobě, jsou 3hrané, hrotité a na okrajích drsné. Květenstvím je 5 - 9tičetný chocholík, květy mají kališní lístky ochlupené a korunní lístky podlouhlé.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone acicularis

synonyma: *Arenaria acicularis*

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Číně v trsech. Dorůstá výšky 5 - 20cm. Listy jsou čárkovité. Kvete v hustém 6 - 9tičetném vrcholíku, kališní lístky bývají fialové, žláznaté, korunní lístky bílé a dlouhé 5 - 6mm.

Vyhovuje jí vlhká půda v polostínu a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone aculeata

synonyma: *Arenaria aculeata*, *Arenaria congesta* var. *aculeata*, *Arenaria fendleri* var. *aculeata*, *Arenaria pumicola* var. *californica*, *Arenaria salmonensis*

oblasti: Arizona, Idaho, Kalifornie, Montana, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Roste v USA v polštářových porostech. Dorůstá výšky 7 - 30cm. Kmínky jsou vzpřímené a od báze dřevnatí. Povrch je žláznatý. Bazální listy jsou vytrvávající, jehlicovité, dlouhé 0,5 - 3,5cm, široké do 1,5mm, trnité a lodyžní tvoří 1 - 3 páry. Květenství je 5 - 25tičetné, vlastní květy mají žláznaté stopky délky 0,3 - 2,5cm, kališní lístky jsou dlouhé 3 - 5mm, korunní lístky jsou bílé a dlouhé 0,4 - 1cm. Plodem je tobolka délky 5 - 9mm obsahující žlutohnědá až šedá eliptická hrbolatá semena délky 1,8 - 3,2mm.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone acutisepala

synonyma: *Arenaria acutisepala*

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku v trsech. Dorůstá výšky 10 - 25cm. Listy jsou dlouhé do 1,5cm. Kvete v chocholíku nebo latě bílými květy.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone androsacea

synonyma: *Arenaria androsacea*

oblasti: Čína, Mongolsko, Sibiř

Roste v Číně, Mongolsku a Sibiři v trsech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou čárkovité, hrotité a dlouhé 0,5 - 1,5cm. Květenstvím je 1 - 3četný vrcholík z bílých květů, stopky jsou žláznaté, kališní lístky kopinaté a okvětní lístky dlouhé 5 - 7mm.

Vyhovují mu skalní pukliny, dostatek vody, chudá dobře propustná chudá půda a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone angustisepala

synonyma: *Arenaria angustisepala*

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku v polštářových porostech. Dorůstá výšky 4 - 8m. Listy jsou špičaté, dlouhé 0,5 - 1cm. Kvete po 1 - 2ks, kališní lístky jsou dlouhé 5 - 8mm, korunní bílé a dlouhé 0,7 - 1,2cm.

Vyhovují mu skalní pukliny, dostatek vody, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone armeniaca

synonyma: *Arenaria armeniaca*

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku v podobě nasivělého polokeře. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Listy jsou štětinovité a špičaté. Kvete v 2 - 3četných svazcích, kališní lístky jsou podlouhlé, tupé a korunní lístky bílé a také podlouhlé.

Vyhovuje jí hudá dobře propustná půda bohatá na živiny, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone asiatica

synonyma: *Arenaria asiatica*

oblasti: Altaj

Roste na Altaji v trsech. Dorůstá výšky 30 - 40cm. Přízemní listy jsou osinovité, dlouhé 5 - 6cm, lodyžní jsou tenké čárkovité a na okraji drsné. Květenství je hroznovité, dlouhé 3 - 7mm, vlastní květy mají korunní lístky bílé a dlouhé 5 - 8mm.

Vyhovuje jí chudí písčité půda na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone biebersteinii

synonyma: *Arenaria biebersteinii*, *Arenaria graminifolia* var. *pubescens*, *Arenaria pineticola*, *Arenaria procera* subsp. *pubescens*

Eremogone blepharophylla

synonyma: *Arenaria blepharophylla*, *Arenaria blepharophylla* subsp. *steveniana*, *Arenaria blepharophylla* var. *parviflora*, *Arenaria graminea* var. *parviflora*, *Arenaria steveniana*, *E. steveniana*

oblasti: Írán, Kavkaz

Roste na Kavkaze. Přízemní listy jdou jehlicovité, dlouhé 6 -15cm a lodyžní jsou menší. Květenstvím je lata tvořená ze 3 - 7mi vrcholíků s 3 - 5ti květy, stopky jsou žláznaté a korunní lístky dlouhé 5 - 7mm.

Eremogone brachypetala

synonyma: *Arenaria brachypetala*, *Arenaria graminea* var. *brachypetala*

Eremogone calcicola

synonyma: *Arenaria calcicola*

Eremogone capillaris

synonyma: *Arenaria airifolia*, *Arenaria capillacea*, *Arenaria capillaris*, *Arenaria capillaris* f. *glandulifera*, *Arenaria capillaris* subsp. *formosa*, *Arenaria capillaris* subsp. *nardifolia*, *Arenaria capillaris* var. *glabrata*, *Arenaria capillaris* var. *glandulosa*, *Arenaria capillaris* var. *nardifolia*, *Arenaria formosa*, *Arenaria formosa* var. *glabra*, *Arenaria formosa* var. *latipetala*, *Arenaria laxmannii*, *Arenaria lychnidea*, *Arenaria nardifolia*, *Arenaria pungens*, *Arenaria setosa*, *Arenaria sibirica*, *Arenaria subulata*, *Arenaria subulata* var. *glabrata*, *Arenaria subulata* var. *glandulifera*, *Arenaria viscosa*, *E. formosa*, *E. nardifolia*, *E. subulata*

oblasti: Aljaška, Altaj, Kazachstán, Severozápadní Teritorium, Yukon

Roste na severu Severní Ameriky a na Sibiři v trsech až kobercových porostech. Dorůstá výšky 3 - 25cm. Kmínky dřevnatí a jsou vzpřímené nebo vystoupavé, někdy žláznaté a někdy nasivělé. Přízemní listy jsou nitkovité, vytrvávající, dlouhé 2 - 8cm, široké do 1mm a lodyžní tvoří 1 - 3 páry. Květenství je 1 - 18tičetné, vlastní květy mají 0,2 - 2cm stopky, kališní lístky obvykle narůžovofialovělé, dlouhé 3 - 5mm, korunní lístky bílé, dlouhé 0,6 - 1cm. Plodem je 5 - 8mm dlouhá tobolka obsahující tmavěhnědá hrbolatá semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *americana*/subsp. *americana*/*E. americana* - západ USA a západní Kanada; tobolky a semeníky mívají 3 - 8 buněčných chlupů

- var. *capillaris*/var. *nardifolia*/*A. formosa* - výška 5 - 20cm; stopky květů, semeníky i tobolky holé

Eremogone caricifolia

synonyma: *Arenaria caricifolia*, *Arenaria gypsophiloides* var. *glabra*, *Arenaria gypsophiloides* var. *parviflora*

Eremogone cephalotes

synonyma: *Arenaria cephalotes*

oblasti: Krym

Roste na Krymu. Přízemní listy jsou čárkovité a lodyžní jsou menší. Květenstvím je hlávka tvořená květy o průměru 5mm.

Eremogone cliftonii

oblasti: Kalifornie

Eremogone congesta

synonyma: *Arenaria congesta*, *Arenaria congesta* var. *expansa*

oblasti: Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Roste v Severní Americe v trsech nebo i kobercích. Dorůstá výšky 3 - 50cm. Kmínky jsou vzpřímené, obvykle žláznaté a od báze dřevnatí. Bazální listy jsou jehlicovité, dlouhé 0,8 - 14cm, široké do 2cm a lodyžní tvoří 3 - 5 párů. Květenství je 4 - 50tičetné, vlastní květy mají 0,1 - 1,6cm stopky, kališní lístky jsou dlouhé 3 - 7mm, korunní jsou bílé, dlouhé 0,5 - 1cm a někdy jsou vykrojené. Plodem je holá tmavě červenohnědá tobolka délky 3,5 - 6mm obsahující hrbolatá semena délky 1,4 - 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *cephaloidea*/*Arenaria cephaloidea*/*Arenaria congesta* var. *cephaloidea* - výška 20 - 50cm; kmínky holé; přízemní listy dlouhé 3 - 14cm, široké 0,4 - 0,7; květenství pyramidální, květy přisedlé, kališní listy dlouhé 4 - 5mm
- var. *charlestonensis*/*Arenaria congesta* var. *charlestonensis* - výška 5 - 14cm; kmínky holé; přízemní listy dlouhé 0,7 - 2cm, široké 0,5 - 0,8mm; květenství zakulacené, květy mají 1 - 4mm stopky, kališní listy dlouhé 4,5 - 5,5mm
- var. *congesta* - výška 5 - 30cm; kmínky holé; přízemní listy dlouhé 3 - 8cm, široké do 1mm; květenství hlávkovité, zakulacené, květy přisedlé, kališní lístky dlouhé 3 - 5mm
- var. *crassula*/*Arenaria congesta* var. *crassula* - výška 15 - 20cm; přízemní listy dlouhé 1,5 - 3cm, široké 1 - 2mm; květenství v hustých vrcholících, květy přisedlé, kališní lístky dlouhé 3,5 - 4mm
- var. *lithophila*/*A. congesta* var. *lithophila*/*A. lithophila* - výška 10 - 30cm; kmínky holé; přízemní listy dlouhé 3 - 6cm, široké do 0,6mm; květenství vrcholíčnaté, květy mají 1 - 5mm stopky, kališní lístky dlouhé 3 - 5mm
- var. *prolifera*/*A. congesta* var. *glandulifera*/*A. congesta* var. *prolifera*/var. *glandulifera* - výška 15 - 25cm; kmínky někdy žláznaté; přízemní listy dlouhé 2 - 8cm, široké do 0,7mm; květenství hlávkovité, květy mají 0,1 - 1,5cm stopky, někdy žláznaté, kališní lístky dlouhé 4 - 6mm
- var. *simulans*/*Arenaria congesta* var. *simulans*/*A. congesta* var. *wheelerensis*/var. *wheelerensis* - výška 10 - 20cm; kmínky holé; přízemní listy dlouhé 2 - 3,5cm, široké do 0,6mm; květenství vrcholíčnaté, květy mají 1 - 5mm holé stopky, kališní lístky dlouhé 5 - 7mm
- var. *subcongesta*/*Arenaria burkei*/*Arenaria congesta* var. *subcongesta*/*Arenaria fendleri* var. *subcongesta*/*Arenaria subcongesta* - výška 8 - 25cm; kmínky holé; přízemní listy dlouhé 0,5 - 2,5cm, široké do 0,8mm; květenstvím je vrcholík, květy mají holé stopky dlouhé 1 - 5mm, kališní lístky dlouhé 3,5 - 4,5mm
- var. *suffrutescens*/*Arenaria congesta* var. *suffrutescens*/*Arenaria suffrutescens*/*Brewerina suffrutescens* - výška 15 - 40cm; kmínky občas žláznaté; přízemní listy dlouhé 1,5 - 8cm, široké do 1,5mm; květenstvím je okoličnatý vrcholík, květy mají 0,1 - 1,2cm stopky, kališní lístky dlouhé 3 - 4mm

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone cucubaloides

synonyma: *Alsinanthus cucubaloides*, *Arenaria cucubaloides*, *Arenaria cucubaloides* var. *glabra*, *Arenaria gypsophiloides*

oblasti: Arménie, Malá Asie (Anatolie), Zakavkazsko

Roste v Zakavkazsku, Arménii a Turecku v trsech. Dorůstá výšky 20 - 40cm. Listy jsou čárkovitě osinovitě. Kvete ve žláznatém 5 - 13tičetném chocholíku, květy mají žláznaté kališní lístky, korunní jsou obvejčité a bílé.

Vyhovují jí středně úrodné a vlhké dobře propustné půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízkami.

Eremogone davisii

synonyma: *Arenaria davisii*, *E. davisii*

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku. Bazální listy jsou šídlovité, dlouhé 0,4 - 1cm a lodyžní zcela chybí. Květenství je žláznaté, 1 - 3četné, kališní lístky hustě žláznaté, růžovofialové a korunní lístky dlouhé 0,8 - 1cm.

Eremogone dianthoides

synonyma: *Alsinanthus dianthoides*, *Arenaria cucubaloides* var. *confertiflora*, *Arenaria dianthoides*, *Arenaria dianthoides* var. *paniculata*

oblasti: Írán, Kavkaz

Roste na Kavkaze v trsech. Dorůstá výšky 25 - 50cm. Listy jsou čárkovité a drsné. Květenstvím je hustá přisedlá hlávka, listeny jsou kožovité, kališní lístky dlouhé 1cm a korunní lístky bílé a dlouhé 1 - 1,5cm.

Vyhovují jí dobře propustné půdy bohaté na živiny na plném slunci.

Množí se semeny nebo dělením.

Eremogone drypidea

synonyma: *Arenaria drypidea*

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku v trsech. Dorůstá výšky 15 - 25cm. Stonky dřevnatější. Listy jsou čárkovité, špičaté a drsné. Květenstvím je lata, květy mají kališní lístky kýlovité a korunní lístky bílé a vejčité.

Vyhovují jí skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízkami.

Eremogone eastwoodiae

synonyma: *Arenaria eastwoodiae*, *Arenaria fendleri* var. *eastwoodiae*

oblasti: Arizona, Kolorado, Nové Mexiko, Utah, Wyoming

Roste v Severní Americe v polštářovitých porostech. Dorůstá výšky 8 - 25cm. Kmínky jsou vzpřímené, mohou být žláznaté a u báze dřevnatí. Přízemní listy jsou jehlicovité, dlouhé 1 - 3,5cm, široké do 0,7mm a lodyžní tvoří 2 - 4 páry. Květenství je 1 - 17tičetné, vlastní květy mají 0,3 - 3cm stopky, občas žláznaté, kališní lístky narůžovofialové, dlouhé 3,5 - 6,5mm, korunní lístky nažloutlé, nahnědlé nebo narůžovofialové, dlouhé 4 - 6,5mm. Plodem je holá tobolka délky 4 - 6mm obsahující hnědá semena délky 1,2 - 1,7mm.

Vyhovují jí chudé písčité půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone fendleri

synonyma: *Arenaria fendleri*, *Arenaria fendleri* subsp. *brevifolia*, *Arenaria fendleri* var. *brevicaulis*, *Arenaria fendleri* var. *brevifolia*, *Arenaria fendleri* var. *diffusa*, *Arenaria fendleri* var. *porteri*, *Arenaria fendleri* var. *tweedyi*, *Arenaria laxiflora*, *Arenaria tweedyi*

oblasti: Arizona, Kolorado, Nové Mexiko, Texas, Utah, Wyoming

Roste v USA v trsech. Dorůstá výšky 2 - 40cm. Kmínky jsou žláznaté, modrozelené a od báze dřevnatí. Přízemní listy jsou nitkovité, dlouhé 1 - 11cm, široké do 0,4mm a lodyžní listy tvoří 4 - 5 párů. Květenství je 1 - 35četné, kališní lístky dlouhé 4 - 8mm, korunní lístky bílé a dlouhé 4 - 8mm. Plodem je 5 - 7mm dlouhá holá tobolka obsahující černá hrbolatá semena délky 1,5 - 2mm.

Eremogone ferganica

synonyma: *Arenaria ferganica*

oblasti: Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán

Roste v Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu v polštářových porostech. Dorůstá výšky 6 - 10cm. Přízemní listy jsou tuhé, úzce kopinaté, špičaté, dlouhé 5 - 6mm a brvité. Květy vyrůstají po 1 - 3ks, kališní lístky jsou kopinaté, korunní lístky bílé a vejčité.

Vyhovují jí skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone ferrisiae

synonyma: *Arenaria macradenia* subsp. *ferrisiae*, *E. macradenia* var. *ferrisiae*

Roste v USA v podobě trsech. Dorůstá výšky 0,1 - 1m. Kmínky jsou vzpřímené a od báze dřevnatí. Bazální listy občas zcela chybí, jsou jehlicovité, dlouhé 2 - 7cm, široké do 1mm a lodyžní tvoří 5 - 7 párů. Květenství je 10 - 80tičetné, květy mají stopky dlouhé 1,5 - 5,5cm, kališní lístky dlouhé 3 - 5mm, korunní lístky bílé nebo nažloutlé a dlouhé 6 - 9mm. Plodem je 6 - 7mm dlouhá holá tobolka obsahující červenohnědá hrbolatá semena délky 1,3 - 3,2mm.

Eremogone franklinii

synonyma: *Arenaria franklinii*, *Arenaria franklinii* var. *minor*

oblasti: Idaho, Nevada, Oregon, Washington

Roste v USA v trsech. Dorůstá výšky 3 - 15cm. Kmínky jsou vzpřímené, modrozelené a dřevnatí. Bazální listy jsou vytrvalé, překrývají se, jsou dlouhé 0,6 - 2cm, široké 1mm a lodyžní tvoří 6 - 10 párů. Květenství je 3 - 45tičetné, květy mají až 4mm stopky, kališní lístky dlouhé 0,5 - 1,2cm, korunní lístky bílé, dlouhé 7 - 9mm. Plodem je holá tobolka délky 2,3 - 3,3mm obsahující černá vejčitá semena.

Vyhovují ji chudé písčité půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone glaucescens

synonyma: Arenaria glaucescens

Eremogone globuliflora

synonyma: Arenaria globuliflora

Eremogone graminea

synonyma: Alsianthus gramineus, Arenaria graminea

oblasti: Arménie, Ázerbájdžán, Írán

Roste v Arménii a Azerbajdžánu v trsech. Dorůstá výšky 20 - 50cm. Kmínky jsou holé. Přízemní listy jsou mírně zakřivené, čárkovité, osinovité, dlouhé 9 - 20cm a lodyžní jsou čárkovité a jemně pilovité. Kvete v protažené latě, korunní lístky jsou bílé a dlouhé 6 - 9mm.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone griffithii

synonyma: Alsine griffithsii, Arenaria griffithii

oblasti: Afganistán, Čína, Pákistán

Roste od Pákistánu po Čínu jako trvalka. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Stonek je na bázi dřevnatý a větvený. Listy jsou k sobě seskupené, čárkovité, špičaté, hnědozelené a dlouhé (0,8 -) 1 - 1,5cm. Kvete po 1 - 3ks, listeny jsou vejčité, dlouhé 3mm, mají 1 - 1,8cm dlouhé stopky, kališní lístky jsou okrouhlé, špičaté, dlouhé 3 - 5mm, korunní obvejčité a dlouhé 0,8 - 1cm. Plodem je tobolka přesahující kalich, má 6 zubů a obsahuje okřídlená semena.

Eremogone gypsophiloides

synonyma: Arenaria caricifolia, Arenaria gypsophiloides, Arenaria gypsophiloides var. rhodopaea

oblasti: JV Evropa, Kavkaz

Roste v jihovýchodní Evropě a Kavkaze v trsech. Dorůstá výšky 5 - 35cm. Kmínky jsou holé, dřevnatější. Listy jsou čárkovité, přízemní široké do 1mm, lodyžní širší, ale kratší. Květenstvím je protažená lata, květy mají kališní lístky vejčité, špičaté, korunní bílé a dlouhé 0,5 - 1cm.

Vyhovují jí chudé písčité půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone holostea

synonyma: *Alsinanthus holostea*, *Arenaria holostea*, *Arenaria holostea* var. *glabra*

oblasti: Arménie, Ázerbájdžán, Írán, Malá Asie (Anatolie), Zakavkazsko

Roste od Turecka po Arménii a Ázerbájdžán v trsech. Dorůstá výšky 10 - 25cm. Listy jsou klikaté, štětinovité a drsné. Květenstvím je řídká lata, květy mají kališní lístky dlouze kopinaté, špičaté, korunní lístky jsou úzce čárkovité a bílé.

Vyhovují jí skalní pukliny, dostatek vody, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone hookeri

synonyma: *Arenaria franklinii* var. *hookeri*, *Arenaria hookeri*, *Arenaria hookeri* subsp. *desertorum*, *Arenaria hookeri* var. *desertorum*, *E. hookeri* subsp. *desertorum*

oblasti: Jižní Dakota, Kansas, Kolorado, Montana, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, Oklahoma, Utah, Wyoming

Roste v USA v trsech. Dorůstá výšky 1 - 15cm. Stonky jsou ochlupené a žláznaté. Listy jsou čárkovité, tuhé a hrotité. Květenstvím je hlávkovitý vrcholík, květy mají korunní lístky bílé a obkopinaté.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone insignis

synonyma: *Arenaria insignis*

oblasti: Írán, Turkmenistán

Roste v Turkmenistánu. Přízemní listy jsou tuhé, špičaté, dlouhé 5 - 7, lodyžní přisedlé a dlouhé 3 - 5mm. Kvete v 1 - 3četném vrcholíku, kališní lístky jsou kopinaté, holé, korunní lístky jsou vejčité a dlouhé 5 - 8mm.

Eremogone isaurica

synonyma: *Arenaria isaurica*

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku v trsech. Dorůstá výšky 5 - 20 (i 30)cm. Lodyhy mohou být sterilní (zkrácené) nebo květonosné. Listy jsou vstřícné, čárkovité, 1žilné, báзовé dlouhé 2cm a lodyžní jsou delší. Květy v řídkém žláznatě ochlupeném 3 - 8mičetném vidlanu, vlastní květy mají 5 korunních lístků bílé barvy se zelenými žilkami, žlutozelenou bází, délkou 0,7 - 1cm, kališní lístky jsou široce vejčité, dlouhé 3 - 4mm, žláznaté a stopky jsou dlouhé 1 - 2mm. Plodem je vejčitá tobolka.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone jakutorum

synonyma: Arenaria jakutorum

Eremogone juncea

synonyma: Arenaria dahurica, Arenaria juncea, Arenaria juncea var. glabra, Arenaria tonsa, E. dahurica

oblasti: Mongolsko, Sibiř

Roste v Mongolsku a Sibiři. Listy jsou nitkovité, objímavé, řídce zubaté, špičaté a dlouhé 1 - 3cm. Květenství je hroznovité, bohaté, květy mají korunní lístky obvejčité a dlouhé 6 - 8mm.

Eremogone kingii

synonyma: Arenaria congesta var. kingii, Arenaria kingii, Stellaria kingii

oblasti: Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Wyoming

Roste v USA v trsech. Dorůstá výšky 1 - 25cm. Kmínky jsou vzpřímené, občas žláznaté. Přízemní listy vytrvávají, jsou nitkovité, dlouhé 0,3 - 4cm, široké do 1,2mm a lodyžní tvoří 1 - 4 páry. Květenství je 1 - 13tičetné, vlastní květy mají 0,2 - 1,5cm stopky, mohou být žláznaté, kališní lístky dlouhé 2,5 - 6mm, korunní lístky bílé (i růžové), dlouhé 3 - 7mm. Plodem je holá 4 - 7mm tobolka obsahující hnědočerná kulovitá semena délky 1,2 - 2,1mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. glabrescens - Kalifornie, Idaho, Nevada, Oregon, Utah

Vyhovují jí dobře propustné půdy bohaté na živiny na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone koelzii

synonyma: Arenaria koelzii

Eremogone ladyginae

Eremogone ledebouriana

synonyma: *Arenaria glutinosa*, *Arenaria ledebouriana*, *Arenaria ledebouriana* var. *armeniaca*, *Arenaria ledebouriana* var. *grandiflora*, *Arenaria ledebouriana* var. *parviflora*, *Arenaria ledebouriana* var. *pauciflora*, *Arenaria tchichatcheffii*, *Arenaria trichotoma*

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku v polštářových porostech. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Listy jsou tuhé, pichlavé a 3hrané. Květenstvím je chocholík, kališní lístky jsou vejčité, korunní lístky bílé a podlouhlé.

Vyhovují jí skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízků.

Eremogone litwinowii

synonyma: *Arenaria litwinowii*

Eremogone longifolia

synonyma: *Alsinanthus longifolius*, *Arenaria longifolia*, *Arenaria otitoides*, *E. otitoides*

oblasti: Mongolsko, Sibiř, V Evropa

Roste v Mongolsku, Sibiři a východní Evropě. Lodyhy jsou holé. Přízemní listy jsou jemně pilovité, drsné, osinovité a lodyžní jsou úzce kopinaté. Kvete v letech z malých vrcholíků.

Eremogone lychnidea

synonyma: *Alsinanthus lychnideus*, *Arenaria lychnidea*, *Arenaria setacea*, *E. airifolia*

oblasti: Kavkaz

Roste na Kavkaze. Přízemní listy jsou jehlicovité, dlouhé 2 - 8mm a lodyžní jsou chudé. Květenstvím je 1 - 5tičetný vrcholík, květy mají korunní lístky obkopynaté, špičaté a dlouhé 1cm.

Eremogone macradenia

synonyma: *Arenaria congesta* var. *macradenia*, *Arenaria congesta* var. *parishiorum*, *Arenaria macradenia*, *Arenaria macradenia* var. *parishiorum*, *E. parishiorum*

Roste v Severní Americe v trsech. Dorůstá výšky 10 - 70cm. Kmínky mohou být žláznaté, dřevnatější. Přízemní listy občas chybí, jsou jehlicovité, dlouhé 0,7 - 7cm, široké do 2mm a lodyžní tvoří 5 - 12 párů. Květenství je 3 - 30tičetné, květy mají 0,3 - 4,5cm dlouhé stopky, mohou být žláznaté, kališní lístky jsou dlouhé 4,5 - 7,2mm, korunní lístky jsou bílé nebo nažloutlé, dlouhé 0,6 - 1,1cm. Plodem je holá tobolka délky 6 - 8mm obsahující zelená až černá hrbolatá semena délky 1,3 - 3,2mm.

Eremogone macrantha

synonyma: *Arenaria holostea* subsp. *macrantha*, *Arenaria macrantha*

oblasti: Arménie, Malá Asie (Anatolie), Zakavkazsko

Roste v Arménii a Turecku. Listy jsou čárkovité a dlouhé 6 - 15cm. Květenstvím je lata, květy mají průměru do 2cm a podlouhlé korunní lístky.

Eremogone meyeri

synonyma: *Alsine billardieri*, *Arenaria meyeri*

oblasti: Mongolsko, Sibiř, Střední Asie

Roste od střední Asie po Sibiř a Mongolské v polštářových porostech. Dorůstá výšky 5 - 20cm. Přízemní listy jsou dlouhé 1 - 3, špičaté, mělce zubaté, lodyžní jsou menší. Květenstvím je 3 - 7mičetná lata, květy mají bílé korunní lístky obvejčitého tvaru délky 5 - 7mm.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone micradenia

oblasti: Slovensko

Eremogone mongholica

oblasti: Altaj, Tuva

Roste na Sibiři v polštářových porostech. Dorůstá výšky 5 - 15cm. Přízemní lístky jsou čárkovité, osinaté a dlouhé 0,5 - 1,2cm. Kvete samostatnými květy, korunní lístky jsou bílé a dlouhé 6mm.

Vyhovují ji kamenitá vlhká místa bohatá na živiny na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone multiflora

synonyma: *Arenaria griffithii* var. *multiflora*, *Arenaria multiflora*

Eremogone oosepala

synonyma: *Arenaria oosepala*

Eremogone paulsenii

synonyma: *Arenaria paulsenii*

oblasti: Kazachstán, Kyrgyzstán

Roste v Kazachstánu a Kyrgyzstánu v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 25cm. Stonky jsou holé. Přízemní listy jsou šídlovité a dlouhé 1 - 1,7cm. Kvete v chocholíku tvořeném sazky květů se špičatými kališními lístky a podlouhlými bílými korunními lístky.

Vyhovují jí skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone pineticola

Eremogone polaris

synonyma: *Arenaria polaris*, *Arenaria procera* subsp. *polaris*, *Arenaria stenophylla* subsp. *polaris*

oblasti: Jakutsko, Krasnojarsk, Z Sibiř

Roste na Sibiři. Přízemní listy jsou šídlovité, dlouhé 3 - 7cm, lodyžní jsou nafialovělé a dlouhé 1,5 - 2,5cm. Kvete v řídkém 3 - 7mičetném hroznu s květy s korunními lístky o délce 6mm.

Eremogone polycnemifolia

synonyma: *Arenaria polycnemifolia*, *E. polycnemifolia*

oblasti: Írán

Roste v Íránu v trsech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Povrch je sivozelený. Stonky u báze dřevnatí. Listy jsou krátké, štětinovité a hrotité. Kvete v 3 - 6tičetných koncových hlávkách, květy mají kališní lístky úzce kopinaté, špičaté a korunní lístky bílé a čárkovité.

Vyhovují jí skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone procera

synonyma: *Arenaria filifolia*, *Arenaria koriniana*, *Arenaria micradenia*, *Arenaria preslii*, *Arenaria procera*, *Arenaria ucranica*, *E. koriniana*, *E. micradenia*, *E. micrantha*

oblasti: Sibiř, Střední Asie, Střední Evropa, V Evropa

Roste od Sibiře po střední Evropu v podobě polokeře. Dorůstá výšky 15 - 40cm. Přízemní listy jsou osinovité, pilovité, dlouze kopinaté a dlouhé 7 - 9cm. Kvete ve vrcholcích, květy mají vejčité kališní lístky a korunní lístky jsou bílé.

Vyhovují jí dobře propustné půdy bohaté na živiny a plné slunce.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone przewalskii

synonyma: *Arenaria przewalskii*

oblasti: Qinghai

Roste v Číně v trsech. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Přízemní listy jsou čárkovité, holé, zoubkované a dlouhé 2 - 3cm, lodyžní jsou kopinaté a tupé. Kvete v 3četných vrcholících, květy mají široce vejčité fialové žláznaté kališní lístky a bílé korunní lístky délky 0,8 - 1cm.

Vyhovují jí středně úrodné a vlhké dobře propustné půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone pseudacantholimon

synonyma: *Arenaria pseudacantholimon*, *Bufonia caespitosa*

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku v polštářových porostech. Dorůstá výšky 15 - 30cm. Přízemní listy jsou jehlicovité, hrotité, dlouhé 1 - 2cm, lodyžní jsou chudé a dlouhé 0,8 - 1,5cm. Květenství je složené z několika 1 - 5tičetných svazků, 1. květ má dlouhou stopku a korunní lístky jsou bílé, dlouhé 5mm.

Vyhovují jí kamenité vlhké půdy bohaté na živiny a polostín.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Eremogone pumicola

synonyma: *Arenaria pumicola*

oblasti: Oregon

Roste v USA v trsech. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Kmínky jsou vzpřímené, žláznaté a dřevnatější. Přízemní listy opadávají, jsou jehlicovité, dlouhé 1,5 - 3,5cm, široké 1 - 2cm a lodyžní listy tvoří 2 - 5 párů. Květenství je 7 - 40tičetné, květy mají 0,3 - 2cm stopky, kališní lístky jsou dlouhé 3 - 4mm, korunní lístky bílé, dlouhé 6,6 - 7,6mm. Plodem je holá tobolka délky 4,5 - 5,5mm obsahující černohnědá hrbolatá semena délky 1,8 - 2,4mm.

Vyhovují jí skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Eremogone pungens

synonyma: *Alsine pungens*, *Arenaria pungens*, *Minuartia pungens*

oblasti: Maroko, Španělsko

Roste v Maroku a Španělsku. Listy jsou hrotité a jehlicovité. Kvete samostatnými květy na dlouhé stopce a kališní lístky jsou delší než korunní.

Eremogone rigida

synonyma: *Alsinanthus rigidus*, *Arenaria androsacea*, *Arenaria holostea*, *Arenaria rigida*

oblasti: Bulharsko, Rumunsko

Roste v Bulharská a Rumunsku. Stonky jsou holé a od báze dřevnatí. Přízemní listy jsou špičaté, čárkovité a lodyžní jsou kratší, ale širší. Kvete v polokulaté latě a květy mají korunní lístky dlouhé 5 - 7mm.

Eremogone saxatilis

synonyma: *Alsine preslii*, *Alsine saxatilis*, *Arenaria graminifolia*, *Arenaria graminifolia* var. *grandiflora*, *Arenaria graminifolia* var. *parviflora*, *Arenaria longifolia*, *Arenaria longifolia* var. *parviflora*, *Arenaria procera* subsp. *glabra*, *Arenaria saxatilis*, *Arenaria stenophylla*, *Arenaria syreistschikowii*, *E. graminifolia*, *E. stenophylla*

oblasti: Asie, Evropa

Roste v teplejších částech Evropy a Asie v trsech. Dorůstá výšky 20 - 40cm. Listy jsou osinaté. Kvete v chocholíku, povrch je žláznatý, květy mají zakulacené kališní lístky, korunní lístky jsou bílé a obvejčité.

Vyhovují jí středně úrodné a vlhké dobře propustné půdy na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

Eremogone scariosa

synonyma: *Arenaria scariosa*

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku. Listy jsou krátké, štětinovité a hrotené. Kvete v 6 - 15tičetném chocholíku, květy mají kališní lístky kopinaté a špičaté, korunní lístky jsou bílé a čárkovité.

Eremogone stenomeres

synonyma: *Arenaria stenomeres*

oblasti: Nevada

Roste v USA v trsech. Dorůstá výšky 7 - 18cm. Kmínky jsou holé, dřevnatějící a vzpřímené. Přízemní listy vytrvávající, jehlicovité, dlouhé 1,5 - 2cm, široké do 1mm a lodyžní tvoří 5 párů. Květenství je 5 - 13tičetné, vlastní květy mají 0,4 - 1,2cm stopky, mohou být žláznaté, kališní lístky dlouhé 4,5 - 5mm, korunní lístky žlutobílé, vykrojené a dlouhé 7,5 - 8,5mm. Plodem je holá tobolka délky 6mm obsahující zakulacená 1mm semena.

Eremogone surculosa

synonyma: *Arenaria surculosa*

Eremogone szowitsii

synonyma: *Arenaria szowitsii*

oblasti: Arménie, Ázerbájdžán, Írán, Malá Asie (Anatolie), Zakavkazsko

Roste v Turecku, Arménii a Azerbajdžánu v trsech. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Listy jsou drsné, štětinovité. Kvete v terminálním vrcholíku, květy mají úzce kopinaté špičaté kališní lístky a korunní lístky jsou bílé a podlouhlé.

Vyhovují ji dobře propustné půdy na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízký.

Eremogone talassica

synonyma: *Arenaria talassica*

Eremogone tetrasticha

synonyma: *Arenaria tetrasticha*

oblasti: Írán

Roste v Íránu v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Přizemní listy jsou bohaté, krátké, 4řadé a lodyžní jsou nitkovité a řídké. Kvete v 3 - 7mičetném chocholíku, květy mají kališní lístky vejčité a žláznaté, korunní jsou bílé a vejčité.

Vyhovují ji středně úrodné a vlhké půdy na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízký.

Eremogone tschuktschorum

synonyma: *Alsine tschuktschorum*, *Arenaria tschuktschorum*

oblasti: V Asie

Roste na dálném východě v podobě polokeře. Dorůstá výšky 15 - 20cm. Přizemní listy jsou šídlovité, dlouhé 1 - 1,5cm, lodyžní jsou kratší, dlouhé 5- 9mm. Kvete v 2 - 5tičetných svazcích, korunní lístky jsou bílé a dlouhé 5 - 7mm.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny nebo řízký.

Eremogone turlanica

synonyma: *Arenaria turlanica*

Eremogone ursina

synonyma: *Arenaria ursina*

oblasti: Kalifornie

Roste v Kalifornii. Stonek je žláznatý. Listy jsou šídlovité a dlouhé 0,5 - 1cm. Kvete v terminálním vrcholíku, kališní lístky jsou zaoblené a korunní lístky jsou bílé a dlouhé 2 - 4mm.

Eremogone zargariana

synonyma: *Arenaria zargariana*, *E. zargariana*

oblasti: Írán

Další informace:

<http://botany.cz/cs/eremogone-isaurica/>

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=4406>

<http://www.kadel.cz/skalnicky/t/kvResult.asp-Rod=Eremogone.htm>

<https://www.rostliny.net/>