

Eremogone aculeata

synonyma: *Arenaria aculeata*, *Arenaria congesta* var. *aculeata*, *Arenaria fendleri* var. *aculeata*, *Arenaria pumicola* var. *californica*, *Arenaria salmonensis*

čeleď: Caryophyllaceae

oblasti: Arizona, Idaho, Kalifornie, Montana, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Roste v USA v polštářových porostech. Dorůstá výšky 7 - 30cm. Kmínky jsou vzpřímené a od báze dřevnatí. Povrch je žláznatý. Bazální listy jsou vytrvávající, jehlicovité, dlouhé 0,5 - 3,5cm, široké do 1,5mm, trnité a lodyžní tvoří 1 - 3 páry. Květenství je 5 - 25tičetné, vlastní květy mají žláznaté stopky délky 0,3 - 2,5cm, kališní lístky jsou dlouhé 3 - 5mm, korunní lístky jsou bílé a dlouhé 0,4 - 1cm. Plodem je tobolka délky 5 - 9mm obsahující žlutohnědá až šedá eliptická hrbolatá semena délky 1,8 - 3,2mm.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

<https://www.rostliny.net/>