

Symplocos racemosa

synonyma: *Dicalix propinquus*, *Symplocos intermedia*, *Symplocos intermedia* var. *trichantha*, *Symplocos macrostachya*, *Symplocos macrostachya* var. *leducii*, *Symplocos propinqua*

čeleď: Symplocaceae

oblasti: Guangdong, Guangxi, Hainan, Indie, Myanmar (Barma), Sichuan, Srí Lanka, Střední Asie, Thajsko, Tichý oceán, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně, Indii, Myanmaru, Thajsku a Vietnamu v podobě keře nebo nízkého stromu. Větve jsou v mládí hnědě ochlupené. Listy jsou kožovité, holé, eliptické, celokrajné nebo řídce zubaté, špičaté nebo tupé, dlouhé 7 - 15 (i 22)cm, široké 1,5 - 5 (i 8)cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 4 - 12 párů žilek, spodní strana v mládí ochlupená a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1,5 (i 2)cm. Kvete v hroznech s délkou 4 - 17cm, listeny jsou dlouhé 2 - 4mm, vlastní květy mají 4 - 6mm dlouhou korunu, 1 - 8mm stopku a semeníky jsou holé, dlouhé 1 - 1,5mm. Plody jsou eliptické, dlouhé 0,8 - 1,1cm s průměrem 0,4 - 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *palauensis* - Tichomoří; listy lesklé, v mládí ochlupené, dlouhé 5 - 22cm, široké 1,5 - 8cm
- var. *racemosa* - Srí Lanka, Myanmar, Thajsko, Vietnam, Laos a Kambodža; listy v mládí na spodní straně ochlupené, dlouhé 7 - 22cm, široké 1,5 - 8cm

<https://www.rostliny.net/>