

Trevesia

čeleď: Araliaceae

Roste od Indie přes Čínu po Malesii v podobě stálezelených nižších ostnitých či ochlupených stromů nebo keřů. Palisty vytváří 2cípy jazýček. Listy jsou velké, kožovité, dlanitě laločnaté či složené. Kvete v okolících nebo v latách oboupohlavnými květy s 7 - 12ti korunními lístky, semeníky jsou obkruželovité až kulovité a uvnitř mají 7 - 12 pouzder. Plode jsou kulovité nebo vejčité peckovice.

Trevesia arborea

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře v podobě stromu. Dorůstá výšky až 15m. Povrch je v mládí načervenalé plstnatý. Listy jsou seskupené na koncích větví, jsou dlanitě laločnaté, okrouhlé, kožovité, velké 25 - 40cm, laloků je 9ks, laloky jsou eliptické až podlouhlé, špičaté, řídce pilovité a řapíky jsou dlouhé 17 - 50cm. Kvete v hroznu tvořeném 8 - 13tičetnými okolíčky, u báze jsou mírně ostnité, osa dlouhá 35cm, listeny jsou dlouhé 1 - 2cm, květy jsou oboupohlavné, mají 1,5 - 2,5cm načervenalé plstnaté stopky, listeny jsou dlouhé 5mm, koruna má délku 6mm a průměr 1,2cm a semeníky jsou polokulovité s 14ti pouzdry.

Trevesia beccarii

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře v podobě keře. Dorůstá výšky až 3m. Kmínky jsou ostnité. Listy jsou seskupené na koncích větví, jsou dlanitě laločnaté, dlouhé 30cm, široké 40cm, lalok je 7 - 9ks, jsou eliptické, tupé, v mládí ochlupené, dlouhé 15cm, široké 7cm, okraj je asymetricky pilovitý a řapíky jsou ochlupené, dlouhé 50cm. Květenství je v mládí ochlupené, 10 - 20tičetné, dlouhé 90cm, vlastní květy mají 5 - 15cm stopky, listeny čárkovité, květy přisedlé, koruna kuželovitá a semeníky obkruželovité s 10 - 12ti pouzdry. Plody jsou kuželovité, hranaté, dlouhé 1cm a široké 7mm.

Trevesia burckii

synonyma: *Hedera aralia*, *T. cheirantha*, *T. palmata* var. *cheirantha*

oblasti: Borneo, Malajský poloostrov, Sumatra, Vietnam

Roste od Vietnamu po Sumatru a Borneo v podobě keře nebo řídce větveného stromu. Dorůstá výšky až 10m. Větve jsou tlusté, drobně ostnité. Listy jsou seskupené na koncích větví, u mladých exemplářů jsou jednoduché nebo dlanitě laločnaté s přisedlými laloky, u dospělých exemplářů jsou zelené, dlanitě složené, laloky dlouze kopinaté anebo čepel má 7 - 9 lístků kopinatého tvaru se špičkou délky do 30cm a šířky do 10cm, báze klínovitá nebo zakulacená, okraj drobně pilovitý, žilnatina vystoupavá a řapíky dlouhé 60cm. Kvete v terminálních latách s délkou do 60cm, větve jsou zakončené 40 - 50tičetným okolíčkem, koruna je polokulovitá, dlouhá 6mm, má 7 - 10 korunních lístků a semeníky jsou široce obkruželovité s 7 - 10ti pouzdry. Plody jsou kulovité, dlouhé 1,5cm s průměrem 1,3cm.

Trevesia lateospina

oblasti: Thajsko

Roste v Thajsku v podobě (i větveného) stromu. Dorůstá výšky do 2,5m. Kmínky jsou černohnědě ochlupené a řídce trnité s kuželovitými trny o délce do 2cm. Listy jsou okrouhlé, dlanitě laločnaté, v průměru mají 30 - 90cm, tvoří je 6 - 13 zastříhovaných úzkých špičatých laloků délky 15 - 36cm s šířkou 2,3 - 5cm, žilnatinu tvoří 9 - 12 párů vystouplých žilek, okraj je drobně pilovitý a řapíky jsou dlouhé 4,5 - 36cm s 1 - 1,5cm pochvou. Květenství je terminální 50tičetný okolík (s 2ma postranními), dlouhé 15 - 30cm, štětinaté, listeny jsou dlouhé do 3cm, květy mají 3 - 4,5cm stopky, listeny 3úhlé, kožovité, dlouhé 1 - 2,5cm a široké 3 - 6mm, korunních lístků je 6 - 7ks délky 5mm a šířky 2,5mm.

Trevesia longipedicellata

synonyma: *T. longipedicellata* var. *palmatipartita*

Trevesia palmata

synonyma: *Aralia dubia*, *Brassaiopsis confluens*, *Brassaiopsis papayoides*, *Fatsia cavaleriei*, *Gastonia palmata*, *Gilibertia palmata*, *Hedera ferruginea*, *Hedera palmata*, *Plerandra jatrophiifolia*, *Plerandropsis bonii*, *T. cavaleriei*, *T. palmata* var. *costata*, *T. palmata* var. *incisa*, *T. sanderi*

oblasti: Bangladéš, Indie, Kambodža, Laos, Nepál, Yunnan

Roste od Indie po Laos v podobě stromu. Dorůstá výšky 3 - 9m při průměru kmene 10 - 12cm. Borka je šedá, červenohnědě ochlupená a nápadně ostnitá s ostny o délce 2 - 3mm. Listy jsou různě tvarované, okrouhlé s průměrem 30 - 90cm, dlanitě laločnaté s 1 - 10ti laloky (u mladých exemplářů celokrajné), laloky eliptické, rozeklané, špičaté, pilovité, papírovité či kožovité a řapíky dlouhé 15 - 90cm. Kvete v latách s délkou do 60cm tvořených terminálním 25 - 65tičetným okolíkem o průměru 6 - 10cm a postranními okolíky, někdy trnité, vlastní květy mají 2 - 4cm stopky, listeny délky 0,2 - 1cm, 8 - 12 nažloutlých korunních lístků délky 5 - 8mm a šířky 1,5 - 2,5mm. Plody jsou jedlé, kulovité a v průměru mají 1 - 2,3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *costata* - Yunnan; plody zploštěle kulovité s 10ti žebry
- 'Micholitzii' - listy v mládí bíle ochlupené, později lesklé, zelené, stříbřitě skvrnitě až tečkované, u dospělých exemplářů mají asymetrické peřenoklané úkrojky, řapíky nemají ostny
- var. *palmata* - plody bez žebí, téměř kulovité s průměrem 1 - 1,8cm

Trevesia rufo-setosa

oblasti: Malajský poloostrov

Roste na Malajském poloostrově v podobě keře. Kmínky jsou ostnité, v mládí červenohnědě ochlupené. Listy jsou seskupené na koncích větví, dlanitě laločnaté, mají průměr 30cm, laloků je 7 eliptického tvaru se špičkou, vyniklou žilnatinou, trnitými zuby, délkou 20cm a šířkou 9cm. Květenství je terminální, dlouhé 20cm, listeny čárkovité délky 1,2cm, korunních lístků je 5 s délkou 6mm a semeníky fertálních květů jsou obkuželovité, štětinaté a mají 5 pouzder. Plody nejsou známy.

Trevesia sphaerocarpa

Trevesia sundaica

synonyma: *Actinophyllum palmatum*, *Aralia palmata*, *Aralia reinwardtiana*, *Brassaia palmata*, *Gastonia sundaica*, *Sciodaphyllum palmatum*, *T. sundaica* var. *glomerata*

oblasti: Jáva, Malé Sundy, Sumatra

Roste na ostrovech jihovýchodní Asie v podobě keře nebo nízkého řídkého stromu. Dorůstá výšky do 8 - 10m. Větve jsou ostnité, v mládí plstnaté. Lisy jsou dlanitě laločnaté, mají průměr do 60cm, holé, lesklé, laloků je 7 - 11 (i 13), jsou eliptické, špičaté, pilovité až zastříhované, dlouhé 30 - 40cm a řapíky jsou dlouhé 50 - 70cm. Květenství tvoří 60cm hrozen složený z 20 - 35tičetných okolíčků, v mládí je rezavě ochlupený, květy mají 2 - 5cm stopky, korunu dlouhou 6mm, 8 - 12 korunních lístků a semeníky jsou široce obkruželovité, rezavě šupinaté s 8 - 10ti pouzdry. Plody jsou polokulovité s průměrem 1,3 - 1,5cm.

Trevesia tomentella

Trevesia valida

synonyma: *T. tomentella*

oblasti: Malajsie, Thajsko

Roste v Thajsku a Malajsii v podobě stromu. Dorůstá výšky 1,5 - 5m při průměru kmene 4 - 5cm. Povrch je bohatě trnitý s trny o délce 3 - 7mm a šířce 1 - 3mm. Listy jsou laločnaté, rozeklané, v průměru mají do 45cm, laloků má 7 - 10ks, jsou kopinaté, špičaté až zakulacené, drobně pilovité, dlouhé 19 - 35cm, široké 5 - 6cm a řapíky jsou řídce trnité, dlouhé do 40cm. Květenství se objevuje v paždí listů na koncích větví, má délku do 40cm, jeho větve jsou zakončené 25 - 45tičetným okolíkem s průměrem 4 - 7,5cm, listeny jsou dlouhé 0,5 - 1,5cm, květy mají 1 - 1,5 (i 3,5)cm stopky, listeny dlouhé 2 - 4mm, korunních lístků je 7 - 8 a mají délku i šířku 5 - 6,5mm. Plody jsou kulovité s průměrem 1,2cm.

Trevesia vietnamensis

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=3265>

<https://www.rostliny.net/>