

Trevesia palmata

synonyma: *Aralia dubia*, *Brassaiopsis confluens*, *Brassaiopsis papayoides*, *Fatsia cavaleriei*, *Gastonia palmata*, *Gilibertia palmata*, *Hedera ferruginea*, *Hedera palmata*, *Plerandra jatrophiifolia*, *Plerandropsis bonii*, *Trevesia cavaleriei*, *T. var. costata*, *T. var. incisa*, *Trevesia sanderi*

čeleď: Araliaceae

oblasti: Bangladéš, Indie, Kambodža, Laos, Nepál, Yunnan

Roste od Indie po Laos v podobě stromu. Dorůstá výšky 3 - 9m při průměru kmene 10 - 12cm. Borka je šedá, červenohnědě ochlupená a nápadně ostnitá s ostny o délce 2 - 3mm. Listy jsou různě tvarované, okrouhlé s průměrem 30 - 90cm, dlanitě laločnaté s 1 - 10ti laloky (u mladých exemplářů celokrajné), laloky eliptické, rozeklané, špičaté, pilovité, papírovité či kožovité a řapíky dlouhé 15 - 90cm. Kvete v latách s délkou do 60cm tvořených terminálním 25 - 65tičetným okolíkem o průměru 6 - 10cm a postranními okolíky, někdy trnité, vlastní květy mají 2 - 4cm stopky, listeny délky 0,2 - 1cm, 8 - 12 nažloutlých korunních lístků délky 5 - 8mm a šířky 1,5 - 2,5mm. Plody jsou jedlé, kulovité a v průměru mají 1 - 2,3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *costata* - Yunnan; plody zploštěle kulovité s 10ti žebry
- 'Micholitzii' - listy v mládí bíle ochlupené, později lesklé, zelené, stříbřitě skvrnitě až tečkované, u dospělých exemplářů mají asymetrické peřenoklané úkrojky, řapíky nemají ostny
- var. *palmata* - plody bez žeber, téměř kulovité s průměrem 1 - 1,8cm

<https://www.rostliny.net/>