

Koelpinia

čeleď: Asteraceae

Nejznámějším druhem je *K. linearis*.

Koelpinia chrysoglochis

oblasti: Írán

Koelpinia deflexa

Koelpinia linearis

synonyma: *K. latifolia*, *Lapsana koelpinia*, *Rhagadiolus koelpinia*

oblasti: Andalusie, Írán, Izrael, Kazachstán, Pákistán, S Afrika, Ťan-šan

Roste ve střední Asii jako jednoletka. Dorůstá výšky (5 -) 8 - 40cm. Stonek je vzpřímený nebo vystoupavý a větvený od báze. Listy jsou střídavé, husté, čárkovité, dlouhé 2 - 14 (i 15)cm a široké 1 - 3mm. Květenstvím je úbor délky 7 - 8mm, šířky (2 -) 3 - 5mm, má (0,5 -) 1 - 4 (i 5)cm stopku, zákrov je 2řadý, vnější zákrovní lístky čárkovité, dlouhé 1 - 3mm, vnitřní úzce kopinaté, dlouhé 5 - 7mm, okvětní lístky jsou žluté nebo nažloutlé a mírně delší zákrovních. Plodem je nažka délky 1 - 1,6cm.

Koelpinia macrantha

synonyma: *K. linearis* var. *macrantha*

oblasti: Írán

Koelpinia sessilis

oblasti: Írán

Koelpinia tenuissima

synonyma: *K. leiocarpa*

oblasti: Afganistán, Írán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Pákistán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán

Roste v Íránu, Pákistánu, Afganistánu, Tádžikistánu, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, Turkmenistánu a Kazachstánu jako jednoletka. Stonek je rozkladitý až vzpřímený a 4 - 5x větvený. Dorůstá délky do 25cm. Listy jsou přisedlé, čárkovité a široké 0,5 - 1mm. Květenstvím je úbor o průměru 2 - 3mm, zákrov je 2řadý, ochlupený, dlouhý 2,5 - 5mm, zákrovní lístky jsou čárkovité, vnější mají 1/2 délku vnitřních, okvětní lístky jsou světle žluté a mírně delší zákrovních. Plodem je nahnědlá nažka délky 0,7 - 1,2cm, šířky 1mm, s krátkým chmýrem a může být mírně zahnutá.

Koelpinia turanica

oblasti: Kazachstán, Pákistán, Tádžikistán, Uzbekistán

Roste v Kazachstánu, Tádžikistánu, Uzbekistánu a Pákistánu v podobě rozkladité až prakticky vzpřímené jednoletky. Dorůstá výšky do 30cm. Listy jsou přisedlé, čárkovité až eliptické, dlouhé 3 - 7cm, široké 2 - 6mm a má 1 žilku. Květenstvím je úbor průměru 5 - 6mm na 1 (za plodu 4)cm stopce, zákrov je 2řadý, dlouhý 0,5 - 1cm, široký 3 - 4mm, zákrovní lístky úzce vejčité, vnější 1/2 délky vnitřních, okvětní lístky žluté a později bělají. Plodem je nahnědlá nažka délky 1,2 - 2,5cm s krátkým chmýrem s háčkem na konci.

<https://www.rostliny.net/>