

# Hypecoum (Pamplina)

čeleď: Papaveraceae

## Hypecoum aegyptiacum

synonyma: Mnemosilla aegyptiaca

oblasti: Egypt

## Hypecoum aequilobum

## Hypecoum alpinum

## Hypecoum dimidiatum

oblasti: Izrael

## Hypecoum duriaei

## Hypecoum erectum

synonyma: H. millefolium

## Hypecoum ferrugineomaculatum

## Hypecoum imberbe

synonyma: H. glaucescens, H. grandiflorum, H. procumbens subsp. grandiflorum

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Francie, Gruzie, Itálie, Jordánsko, Korsika, Kypr, Makedonie, Maroko, Pennsylvania, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Srbsko, Sýrie, Tunisko

Pochází ze středozeší a Blízkého východu, zavlečen byl do USA. Paří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 10 - 45cm. Lodyhy jsou vzpřímené až poléhavé. Listy jsou modrozelené, 2 - 3x zpeřené a konce konečných úkrojků rozšířené. Kvete žlutými až žlutooranžovými květy, kališní lístky jsou 2, žlutozelené, okvětní lístky jsou 4, z toho 2 3laločné obvykle se zelenou skvrnou a zbývající 2 jsou rozdělené na 3 podlouhlé části s černými skvrnami na bázi. Plodem je vzpřímená zahnutá tobolka obsahující zakulacená hnědá semena. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. pseudograndiflorum

Vyhovují mu křoviny, okraje silnic, pole, atp.

### Hypocoum leptocarpum

synonyma: *H. chinense*

oblasti: Afganistán, Himálaj, Pákistán, Turkestán, Z Mongolsko

Roste Mongolsku, Himálaji, Pakistánu, Turkestánu a Afganistánu jako jednoletka nebo dvouletka. Dorůstá výšky (10 -) 15 - 30cm. Stonek je vzpřímený a na bázi větvený. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou peřenosečné, dlouhé 5 - 11cm, horní jsou menší, laloky jsou dlouhé 1 - 1,2 (i 1,5)cm, široké 1 - 3mm, segmenty jsou čárkovité až podlouhlé, špičaté a dlouhé 2 - 3,5mm. Květenství je 2 - 4 (i 5)květý okolík, listeny jsou hluboce peřenosečné, laloky čárkovité, dlouhé 3 - 6mm, vlastní květy jsou fialové o průměru 0,8 - 1,2cm, mají 1 - 4 (i 5)mm stopku (za plodu až 1,25cm), kališní lístky jsou 2, vejčité, špičaté, dlouhé 2 - 3mm, široké 1mm, korunní lístky jsou ve 2 přeslenech, vnější jsou široce obvejčité, na vrcholu kýlnaté, dlouhé 0,9 - 1cm, široké 6mm, vnitřní laločnaté, vnější 2 laloky úzce eliptické až podlouhlé, zašpičatělé a střední lalok lžičkovitý. Plody jsou čárkovité, dlouhé 1,5 - 3 (i 3,3)cm, široké 1 - 1,5 (i 1,75)mm a obsahují 5 - 10 podlouhlých semen.

### Hypocoum littorale

synonyma: *H. deuteroparviflorum*, *H. geslinii*

### Hypocoum parviflorum

oblasti: Kazachstán

### Hypocoum pendulum

synonyma: *H. parviflorum*, *H. pendulum* var. *parviflorum*, *H. tetragonum*

oblasti: Andalusie, Írán, Katalánsko, Maryland, Pákistán

Roste jako jednoletka. Dorůstá výšky (5 -) 10 - 35cm. Stonek je vystoupavý až vzpřímený. Při zemi vytváří 2 - 3 peřenosečné listy délky 3 - 10cm, vrcholový úkrojek je čárkovitý, dlouhý 2 - 6mm a široký 1 - 1,5mm. Květenstvím je (1 -) 2 - 4květý úžlabní nebo vrcholový okolík na 1 - 4cm stopce, zákrovní listeny čárkovité, dlouhé 5 - 8mm, vlastní květy jsou žluté, průměru 0,8 - 1,2cm, mají 0,5 - 1,2cm stopku, kališní lístky jsou vejčité, zašpičatělé až špičaté, dlouhé 2 - 2,5mm, široké 1,5 - 2mm, vnější korunní lístky jsou eliptické, 3laločné, dlouhé 0,8 - 1,2cm, široké 5 - 7mm, vnitřní 2 lístky jsou hluboce 3laločné, dlouhé 6 - 8mm, široké 2 - 3mm, střední je lžičkovitý a vnější laloky jsou úzce eliptické. Plody jsou čárkovité až úzce podlouhlé, dlouhé 3 - 7cm, široké 3 - 5mm a obsahují nahnědlá semena délky 2mm a šířky 1,5mm. Existují nitrodruhové taxony:

- var. *parviflorum*
- var. *pendulum*
- var. *trilobum*

### Hypocoum procumbens (Pamplina poléhavá)

synonyma: *Chiazospermum pendulum*, *H. ponticum*

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Bulharsko, Egypt, Francie, Itálie, Jordánsko, Jugoslávie, Katalánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libye, Makedonie, Maroko, Portugalsko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Tunisko, Turecko

Roste v sušších oblastech středozeří v podobě jednoletky s mnoha lodyhami. Dorůstá výšky (3 -) 5 - 20cm. Povrch je sivozelený. Stonky jsou větvené, rozkladité až vystoupavé a dlouhé 10 - 30cm. Listy jsou střídavé, 2 - 3x zpeřené a úkrojky jsou podlouhlé. Kvete samostatnými květy na koncích stonků, jsou 4četné, mají 2 kališní lístky, korunní lístky nestejně, žluté, dlouhé 0,5 - 1,5cm, 2 vnější 3laločné, prostřední lalok je nejdelší a vnitřní 2 jsou 2klané. Plodem je úzce válcovitý obloukovitě prohnutý a rozpadavý struk délky 4 - 6cm. Při poranění roní vodnatý bezbarvý latex. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *grandiflorum*
- subsp. *procumbens*

Vyhovují mu pobřežní písčiny, úhory nebo pole.

### *Hypecoum pseudograndiflorum*

### *Hypecoum torulosum*

oblasti: Itálie

### *Hypecoum trilobum*

synonyma: *H. pendulum* var. *trilobum*

### *Hypecoum trullatum*

### *Hypecoum zhukanum*

Další informace:

<http://botany.cz/cs/hypecoum-imberbe/>

<https://www.rostliny.net/>