

Foeniculum vulgare (Fenykl obecný)

synonyma: Anethum dulce, Anethum foeniculum, Anethum minus, Anethum panmori, Anethum panmoriun, Anethum pannorium, Anethum piperitum, Anethum rupestre, Foeniculum azoricum, Foeniculum capillaceum, Foeniculum divaricatum, Foeniculum dulce, Foeniculum foeniculum, Foeniculum giganteum, Foeniculum officinale, Foeniculum panmoriun, Foeniculum piperitum, Foeniculum rigidum, Foeniculum scoparium, F. subsp. piperitum, F. subsp. sativum, F. var. sativum, Ligisticum foeniculum, Meum foeniculum, Selinum foeniculum, Seseli foeniculum

čeleď: Apiaceae

oblasti: Alberta, Andalusie, Arizona, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Illinois, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Louisiana, Maine, Makaronésie, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Nebraska, Německo, Nevada, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Pensylvánie, Portoriko, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Střední středozemí, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Virginie, Washington, Wisconsin, Z Asie, Západní Virginie

Pochází ze středozemí a západní Asie. Patří mezi dvouletky nebo trvalky, ale jako zelenina musí být jednoletá. Celá je silně aromatická. Dorůstá výšky (0,5 -) 0,8 - 2 (i 2,5)m a šířky 40cm. Lodyhy jsou kulaté, hustě jemně proužkované, lesklé a s nápadnými uzlinami. Listy jsou jemné, 3 - 4x zpeřené, dlouhé 10 - 40cm, široké 9 - 35cm (na bázi) tvořené nitkovitými výběžky a lodyžní listy jsou střídavé. Kvete žlutými kvítky ve složeném okolíku s (5 -) 12 - 25 (i 30)ti paprsky délky 1 - 6cm, vrcholový bývá nejvyšší, obaly i obalíčky chybějí, vlastní květy jsou drobné, symetrické, kališní lístky jsou zakrnělé, korunní lístky jsou žluté a dlouhé 1mm. V období nejdelšího dne se doporučuje pro delší dobu květu stonk seříznout. Patří mezi významnější nektarodárné rostliny. Plodem je aromatická 2nažka s 5ti ostrými žebry o velikosti 2 - 7 (i 8)mm. Používá se v léčitelství, bulvy naopak jako zelenina. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. azoricum/subsp. azoricum (F. sladký/F. boloňský) - jihozápadní Evropa; listové pochvy na spodní straně jsou masité, bělavé a vytvářejí hlízu
- 'Bronze Giant' - bronzově zbarvené lodyhy
- 'Budakalászi'
- var. dulce
- 'Krajový'
- subsp. piperitum - barva sivozelená; listy dužnaté, úkrojky dlouhé do 1 (i 1,2)cm, ostřejší chuti; okolíky mají 4 - 10 paprsků
- 'Purpureum'
- 'Purpurascens' - listy v mládí jemně dělené, bronzové až růžovofialové
- 'Rubrum'
- subsp. vulgare/var. vulgare (Fenykl obecný pravý)

Potřebuje přímé slunce a teplo. Půda by měla být dobře propustná, hluboká, vápenitá, vlhká a bohatá na živiny.

Množí se semeny.