

Cynomorium (Cynomorium)

čeleď: Cynomoriaceae

Existuje pouze 1 druh.

Cynomorium coccineum (Cynomorium podivné)

synonyma: C. coccineum subsp. coccineum

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Egypt, Itálie, Izrael, Jordánsko, Katalánsko, Kazachstán, Korsika, Libye, Makaronésie, Maroko, Pákistán, Palestina, Portugalsko, Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Sýrie, Tunisko

Roste ve středozeří a střední Asii jako parazitická dužnatá trvalka. Dorůstá výšky (5 -) 15 - 30 (i 50)cm. Oddenek je větvený. Stonek je válcovitý, červený a nevětvený. Listy jsou redukované v 3boké šupiny. Květy bývají jednopohlavné, malé, seskupené v klasovitém vrcholovém květenství o délce 6 - 15 (i 30)cm v barvě tmavě červenorůžovofialové. Plodem je nažka/oříšek. Využívá se v tradiční medicíně. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. songaricum/C. purpureum/C. songaricum

Parazituje na kořenech slanomilných rostlin, zejména tamaryšků a slanobýlu. Vyhovují mu suchá skalnatá nebo písčítá místa.

Další informace:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Cynomorium>

<https://www.rostliny.net/>