Hepatica nobilis (Jaterník podléška)

synonyma: Anemone hepatica, Hepatica triloba

čeleď: Ranunculaceae
oblasti: Alabama, Alpy, Andalusie, Arkansas, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Itálie, Japonsko, Jižní Karolína, Karpaty, Kentucky, Maine, Manitoba , Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Polsko, Pyreneje, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Středozemí, Švýcarsko, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste ve střední Evropě jako stálezelená trvalka. Dorůstá výšky (5 -) 10 - 18 (i 25)cm. Listy jsou přízemní, 3laločné, široce vejčité (tvar jaterních laloků), kožovité, mírně lesklé, v mládí ochlupené, spodní strana je nafialovělá a řapík je tenký a delší. Kvete modrými až modrofialovými (výjimečně bílými nebo růžovými) květy o šířce 1,2 - 3 (i 4)cm s 6 - 10ti okvětními lístky. Plodem je nažka. Semena rozšiřují mravenci. Má léčivé účinky, přestože je mírně jedovatý. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. acuta/H. acutiloba/Anemone acutiloba - Severní Amerika
- var. alba - bílé květy
- var. japonica - Japonsko
- var. japonica f. magna
- var. nobilis - Alpy a Skandinávie
- var. obtusa/H. americana/Anemone americana - Severní Amerika
- 'Pleniflora' - květy plnokvěté, fialové se světlým středem
- var. pubescens - Japonsko
- var. pyrenaica - Pyreneje
- 'Tadeas' - velké listeny

Vyhovují ji mírně vlhké půdy v listnatých lesích a křovinách s dostatkem živin i s přítomností vápníku nebo mírnou kyselostí v polostínu nebo stínu.

Množí se dělením trsů.

https://www.rostliny.net/