

Oenothera affinis

synonyma: *Oenothera berteriana*, *Oenothera chilensis*

čeleď: Onagraceae

oblasti: Afrika, Austrálie, Bolívie, Brazílie, Evropa, Havajské ostrovy, Pákistán, Střední Argentina, Valparaíso

Roste od Bolívie a Brazílie po Argentinu a Čile jako jednoletka, zavlečená byla i do Evropy, Austrálie, Afriky, Asie a na Havajské ostrovy. Dorůstá délky 0,4 - 1,5m. Stonek může být větvený. Povrch je ochlupený. Lodyžní listy jsou úzce kopinaté a přisedlé, dlouhé 5 - 15cm a široké 0,5 - 1,5cm. Květenství je větvené, listeny úzce kopinaté, přisedlé, dlouhé (3 -) 4 - 9cm, široké 0,5 - 1,2cm, vlastní květy mají trubku délky 8 - 11 (i 13)cm, kališní lístky jsou dlouhé 2 - 3,5cm se vzpřímeným vrcholem délky 1,5 - 4mm, korunní lístky jsou žluté, široce obvejčité a dlouhé (1,5 -) 2 - 4cm. Plodem je tobolka délky (2 -) 2,5 - 4 (i 5)cm, šířky 3 - 4mm a v horní 1/3 tlustější.

<https://www.rostliny.net/>