

# Lagarostrobos

čeleď: Podocarpaceae

Roste v Tasmánii v podobě stromu. Listy na mladých exemplářích jsou čárkovité a šídlovité, u dospělých exemplářů široké a šupinovité. Vytváří samostatné samčí a samičí šištice.

## Lagarostrobos franklinii

synonyma: *Dacrydium franklinii*, *Lepidothamnus franklinii*

oblasti: Tasmánie

Roste v Tasmánii v podobě dvoudomého kuželovitého stromu. Údajně se dožívá věku až 2000 (i 3000)let. Dorůstá výšky (10 -) 15 - 20 (i 30)m při průměru kmene 0,7 - 1m. Dřevo je měkké. Borka je šedá až stříbřité a hladká. Větve jsou našedlé a převislé. Listy jsou šupinovité, dlouhé 1mm, na sobě natěsnané, kýlnaté, později i vypuklé, vyrůstají ve spirále a na hřbetě mají řídké bílé průduchy. Šištice jsou drobné, vrcholové, mají 4 - 8 šupin, samčí jsou žluté, dlouhé 5 - 8mm, široké 1 - 2m. Semena jsou kulovitá a v průměru mají 2mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Pendulum' - habitus převislý
- 'Roosevelt' - habitus převislý habitus s nitkovitými větvemi

Růst je pomalý.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=3434>

<https://www.rostliny.net/>