

Oenothera biennis (Pupalka dvouletá)

synonyma: *Brunyera biennis*, *Oenothera muricata*, *Oenothera suaveolens*, *Onagra biennis*, *Onagra muricata*

čeleď: Onagraceae

oblasti: Alabama, Alberta, Andalusie, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází z východu a středu Severní Ameriky, od Newfoundlandu po Albertu a na jih k Floridě a jihozápad Texasu. Patří mezi dvouletky. Dorůstá výšky 0,3 - 1,5 (i 2)m. Lodyha je v horní části větvená. Listy jsou laločnaté, 5 - 20 (i 25)cm dlouhé a 1 - 2,5cm široké. První rok vytváří listovou růžici a v dalším roce na stonku vyrůstají ve spirále. Kvete v létě žlutými květy o průměru 2,5 - 5cm složených z kališních lístků délky 1,2 - 2,5cm, 5ti korunních lístků o délce 1,4 - 3cm a šířce 1,6 - 3,8cm. Odkvetlé jsou oranžové. Otevírají se až večer a zavírají ráno. Plodem je válcovitá tobolka délky 2 - 4cm a šířky 4 - 6mm. Obsahuje 1 - 2mm dlouhá semena. Používá se v léčitelství. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *austromontana*
- subsp. *biennis*
- var. *pycnocarpa*
- stenopetala
- subsp. *suaveolens*

Vyhovují ji kamenitá místa, lomy, pískovny, atp. Půda by měla být chudá na živiny a rostlina by měla mít dostatek plného slunce.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>