

## Phytolacca (Lícidlo)

čeleď: Phytolaccaceae

Roste v Severní i Jižní Americe, východní Asii a Novém Zélandu jako trvalka. Používá se v léčitelství. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Laka Boom'

### Phytolacca acinosa

oblasti: JV Asie

Pochází z jihovýchodní Asie. Dorůstá výšky 90cm. Listy mají eliptický tvar a délku 12cm. Kvete bílými květy o průměru 1cm v hroznu až 10cm dlouhým. Plodem je černá bobule s ledvinovými černými semeny. Obsahuje toxíny a má halucinogenní účinky.

### Phytolacca americana (Lícidlo americké)

oblasti: Alabama, Albánie, Alžírsko, Arizona, Arkansas, Baleáry, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Gruzie, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Korsika, Kréta, Krym, Louisiana, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Nizozemí, Nové Mexiko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Palestina, Pennsylvania, Portugalsko, Quebec, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Severní Karolína, Sicílie, Slovensko, Střední Amerika, Španělsko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází z východu Severní Ameriky, ale naleznete ji i ve střední Americe. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (0,8 -) 1 - 3 (i 4)m. Listy mají široce oválný tvar délky 10 - 25cm, šířky 5cm a řapíky mají délku (1,5 -) 2 - 3 (i 4)cm. Kvete bílými květy v klasech o délce 5 - 20cm a vlastní květy mají 0,4 - 1,2cm stopku. Plodem jsou černé bobule průměru 0,7 - 1,2cm vyrůstající v hroznu. Jeho barvivo se využívalo k barvení vín. Rostlina je jedovatá.

Vyhovuje ji hlína bohatá na živiny, zejména na dusík a polostín.

### Phytolacca bogotensis

oblasti: Maryland

### Phytolacca clavigera

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

### Phytolacca decandra (Lícidlo obecné)

Pochází z Ameriky. Roste na přímé lodyze. Kvete v hroznu.

### Phytolacca dioica (Lícidlo dvoudomé)

oblasti: Alžírsko, Argentina, Francie, Itálie, Katalánsko, Makaronésie, Řecko, Sardínie, Sicílie

Pochází z pamp Jižní Ameriky. Roste v podobě stromu. Patří mezi dvoudomé rostliny. Dokáže dorůst až do výšky 8 - 10m. Báze kmene je bochníkovitě ztlustlá. Kvete žlutými květy v hroznu. Rostlina je jedovatá. Hodí se pro pěstování sukulentních bonsají.

Přezimuje při teplotě kolem 10°C.

### Phytolacca dodecandra

oblasti: Etiopie

Pochází z Etiopie. Využívá se domorodým obyvatelstvem k otravě ryb při rybaření.

### Phytolacca esculenta (Lícidlo jedlé)

oblasti: Čína, Japonsko, Korea

Roste v Číně, Japonsku a Koreji jako trvalka. Dorůstá výšky 1 - 2m. Pod zemí se nachází hlíza. Lodyha na bázi dřevnatí, je vidličnatě větvená a načervenalá. Listy jsou střídavé, vejčité, celokrajné, zelené, dlouhé 7 - 15cm a řapíky jsou dlouhé do 1,5cm. Květenstvím je vzpřímený hrozen délky až 20cm, vlastní květy jsou drobné, zpravidla oboupohlavné, stopkaté, korunní lístky jsou na bázi srostlé, cípy vejčitěkulovité, bělavé, později růžové až načervenalé. Plodem je červenočerná kulovitá peckovice. Využívá se k dobarvování a v léčitelství.

### Phytolacca heterotepala

oblasti: Kalifornie, Mexiko

Pochází z Mexika.

### Phytolacca icosandra

oblasti: Arizona, Jižní Amerika, Kalifornie, Maryland, Portoriko

Pochází z Jižní Ameriky. Dorůstá výšky 3m. Listy jsou dlouhé 10 - 20cm a široké 5 - 9cm. Kvete ve svislých hroznech dlouhých 10 - 15cm. Každý růžový květ má v průměru 5 - 10mm. Plodem je černá bobule o průměru 5 - 8mm.

## Phytolacca octandra

oblasti: Arizona, Havajské ostrovy, Nový Zéland, Wisconsin

Pochází z Nového Zélandu.

## Phytolacca rivinoides

oblasti: Portoriko

## Phytolacca rugosa

## Phytolacca sandwicensis

oblasti: Havajské ostrovy

Pochází z Havajských ostrovů.

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/cherbar/heslo.php?363>

<http://colee-rostliny.ic.cz/licidlo.html>

<http://colee-rostliny.ic.cz/licidlod.html>

[http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADcilo\\_jedlo](http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADcilo_jedlo)

<http://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=97>

<http://www.biotox.cz/enpsyro/pj3rpha.html>

<http://www.garten.cz/a/cz/5655-phytolacca-americana-licidlo-americke/>

<http://www.sukulenty.estranky.cz/clanky/pestitelska-praxe/phytolacca-dioica>

<https://www.rostliny.net/>