

# Guarianthe

čeleď: Orchidaceae

Jedná se o epifytické orchideje rostoucí od Mexika po sever Jižní Ameriky. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Barbara Kirch' - *G. bowringiana* x *G. aurantiaca*

Plodem je tobolka.

## Guarianthe aurantiaca

synonyma: *Amalia aurantiaca*, *Broughtonia aurea*, *Cattleya aurantiaca*, *Epidendrum aurantiacum*, *Epidendrum aureum*, *Laelia aurantiaca*

oblasti: Guatemala, Kostarika, Mexiko, Nikaragua

Roste od Mexika po Kostariku jako epifyt v trsech. Hlízy má dlouhé 1 - 3,5cm a vyrůstají z nich 2 řemenovité kožovité tmavězelené lesklé listy o délce do 12cm a šířce do 4,5cm. Kvete v 3 - 10tičetném okolíku oranžovými až žlutooranžovými květy, spodní pysk je stočený, na vnitřní straně červenohnědě skvrnitý, korunní lístky jsou eliptické, špičaté, dlouhé 2 - 2,8cm a široké 5 - 8mm. Plodem je tobolka délky 1,3 - 1,5cm.

Vyskytuje se na skalách a ve vlhkých lesích.

## Guarianthe bowringiana

synonyma: *Cattleya autumnalis*, *Cattleya bowringiana*, *Cattleya skinneri* var. *bowringiana*

oblasti: Belize, Chiapas, Guatemala, Honduras

Roste v Mexiku a střední Americe.

## Guarianthe patinii

synonyma: *Cattleya patinii*, *Cattleya patinii* var. *alba*, *Cattleya skinneri* subsp. *deckeri*, *Cattleya skinneri* var. *autumnalis*, *Cattleya skinneri* var. *parviflora*, *Cattleya skinneri* var. *patinii*, *Epidendrum huegelianum* var. *parviflorum*

oblasti: Ekvádor, Karibik, Kolumbie, Kostarika, Panama, Venezuela

Roste ve střední Americe a na severu Jižní Ameriky.

## Guarianthe skinneri

synonyma: *Cattleya deckeri*, *Cattleya laelioides*, *Cattleya pachecoi*, *Cattleya skinneri*, *Cattleya skinneri* f. *alba*, *Cattleya skinneri* var. *alba*, *Epidendrum huegelianum*, *Epidendrum hugelianum*, *G. deckeri*, *G. guatemalensis* var. *pachecoi*, *G. skinneri* f. *alba*

oblasti: Belize, Chiapas, Guatemala, Honduras, Karibik, Kostarika, Nikaragua, Panama, Salvador

Roste v Mexiku a střední Americe. Stonky jsou dlouhé 15 - 30cm a v průměru mají 3cm. Listy jsou párovité, tuhé, zelené, kožovité, matné a dlouhé 10 - 20cm. Kvete v 4 - 15tičetné latě růžovými až růžovofialovými (i bílými) květy s průměrem (5 -) 6,5 - 11cm a korunními lístky o délce 5,5cm. Spodní pysk je stočený do trubky, má délku 6cm a šířku 4,5cm. Plodem je rýhovaná tobolka délky 4 - 5cm.

### Guarianthe skinneri x Rhyncholaelia digbyana

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'FMB'

### Guarianthe x guatemalensis

synonyma: *Cattleya x guatemalensis*, *Cattleya x guatemalensis* var. *wischhuseniana*, *Epicattleya guatemalensis*

oblasti: Belize, Chiapas, Guatemala, Honduras, Nikaragua

Roste v Mexiku a střední Americe. Jedná se o hybrid *G. aurantiaca* x *G. skinneri*.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/guarianthe-aurantiaca/>

<https://www.rostliny.net/>