

Chisocheton ceramicus

synonyma: *Amoora caesifolia*, *Amoora cupulifera*, *Amoora mindorensis*, *Chisocheton clementis*, *Chisocheton doctersii*, *Chisocheton globosus*, *Chisocheton junghuhnii*, *Chisocheton macrothyrsus*, *Chisocheton pachycalyx*, *Chisocheton peekelianus*, *Chisocheton rhytidocalyx*, *Chisocheton sandoricocarpus*, *Chisocheton spectabilis*

čeleď: Meliaceae

oblasti: Borneo, Filipíny, Jáva, Malajský poloostrov, Melanésie, Papua-Nová Guinea, Sumatra, Thajsko, Vietnam

Roste od Vietnamu a Thajska přes Malésii po Novou Británii v podobě stromu . Dorůstá výšky do 30m při průměru kmene až 40cm. Borka je tmavěhnědá. Větve mají jizvy po opadlých listech. Listy mají délku do 1,5m, řapíky jsou dlouhé 10 - 15cm, jsou zpeřené s vřetenem průměru až 1,1cm, tvoří je max. 17 párů lístků, vlastní lístky jsou vejčité, dlouhé 4 - 38cm, široké 2,7 - 15cm, při rašení jsou načervenalé, zašpičatělé, žilnatinu tvoří 10 - 15 párů žilek a řapíčky jsou dlouhé 0,3 - 1,3cm. Květenstvím je kytice délky do 65cm s větvemi délky do 45cm, vlastní květy jsou růžové, kalich má délku 2 - 5,5mm, korunních lístků je 4 - 6ks, mají délku 1,3 - 1,9cm, šířku 2 - 3mm. Plodenství je velké až 45cm, tvoří jej tobolky délky do 3,2cm, šířky 4,5cm a jsou téměř kulovité obsahující 1 - 2 semena.

<https://www.rostliny.net/>