

Solidago gigantea (Zlatobýl obrovský)

synonyma: *Aster latissimifolius* var. *serotinus*, *Doria dumetorum*, *Doria pitcheri*, *Solidago cleliae*, *Solidago dumetorum*, *S. subsp. serotina*, *S. var. pitcheri*, *S. var. serotina*, *S. var. shinneryi*, *Solidago pitcheri*, *Solidago serotina*, *Solidago serotina* var. *gigantea*, *Solidago serotina* var. *minor*, *Solidago serotinoidea*, *Solidago shinneryi*, *Solidago somesii*, *Solidago x leiophallax*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alabama, Alberta, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Pochází z jižní Kanady a USA. Dorůstá výšky 0,8 - 2 (i 2,3)m. Pod zemí se skrývá hodně rozvětvený oddenek. Lodyha je vzpřímená, lysá (v květenství krátce ochlupená) a bělavě ožíněná. Listy mají kopinatý tvar se špičkou na konci, pilovým ochlupeným okrajem, délku 7 - 18cm, šířku 1,2 - 3cm a spodní strana je na žilkách ochlupená. Květenstvím je úbor, zákrov má délku 3 - 4mm, jazykovité květy jsou zřetelně delší než trubkové. Plodem je ochmýřená nažka. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *leiophylla*
- subsp. *serotina*

Vyhovují mu okraje vod, křoviny, mýtiny, atp. Roste na plném slunci i v polostínu.

<https://www.rostliny.net/>