

Lamarckia (Zlatochvost)

synonyma: Achyrodes, Chrysurus, Pterium, Tinaea

čeleď: Poaceae

Rodové jméno bylo vybráno na počest francouzského přírodovědce jménem J. B. Lamarck. Existuje 1 druh.

Lamarckia aurea (Zlatochvost zlatý)

synonyma: Achyrodes aureum, Chrysurus aureus, Cynosurus aureus, L. hookeriana, Pterium elegans

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Baleáry, Chorvatsko, Egypt, Etiopie, Francie, Gruzie, Írán, Itálie, Izrael, J Severní Amerika, Jižní Amerika, Jordánsko, Katalánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Makaronésie, Maroko, Pákistán, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Střední Amerika, Sýrie, Tunisko, Turecko

Roste ve středozeší, severovýchodní Africe a dále po Pákistán jako jednoletka v trsech, zavlečená byla do Severní i Jižní Ameriky, Asie a Austrálie. Dorůstá výšky (4 -) 10 - 20 (i 35)cm. Stébla jsou přímá nebo vystoupavá, zelená, později od báze žloutnoucí. Listy jsou úzce kopinaté, dlouhé 2 - 14cm, široké (0,1 -) 0,2 - 0,6 (i 1)cm, pochvy drsné, vrchní až nafouklé a jazýček je dlouhý 0,5 - 1cm. Kvete v klasovitě stažené jednostranné žlutozelené latě s délkou 2 - 6 (i 8)cm a šířkou 1 - 2,5cm, klásky vyrůstají ve skupinách po 2 - 5, jsou 2jího typu, plodné, dlouhé 3 - 4mm s 1 oboupohlavným květem a 1 jalovým s 0,6 - 1cm dlouhou osinou pluchy, jalové klásky jsou dlouhé 6 - 8mm a postrádají osinu. Plodem je obilka.

Vyhovují mu suché trávníky, kamenité svahy, křoviny, okraje cest, atp. s obvykle vápencovým a písčtým podkladem.

Množí se semeny.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/lamarckia-aurea/>

<https://www.rostliny.net/>