

Baccharis halimifolia (Pomíšenka nepitolistá)

synonyma: *Baccharis axillaris*, B. var. *angustior*, *Conyza halimifolia*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Evropa, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Karibik, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Mexiko, Mississippi, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Jižní Wales, Nový Zéland, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Queensland, Rhode Island, Severní Karolína, Texas, Virginie

Roste v Kanadě, USA, Mexiku a Karibiku v podobě dvoudomého keře (i stromu). Zavlečen byl do Austrálie, Nového Zélandu a Evropy. Dorůstá výšky i šířky 1 - 3 (i 4)m. Listy jsou tlusté, široce obkopinaté, sivozelené, celokrajné, dlouhé 2 - 8,5cm, široké 0,5 - 7cm a řapíky jsou krátké. Květenství je bílé, 3 - 5tičetně latnaté, široké 2 - 6mm a zákrov je dlouhý 4mm. Plodem je nažka délky 1 - 1,6mm s 6 - 8mm 2řadým chmýrem. Semena jsou pro člověka jedovatá. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Autumn Agnel' - výška 1,2 - 1,8m; květenství kuželovité až kulovité; plody výrazně stříbrobílé
- 'White Caps' - výška do 3,6m; květy bílé

<https://www.rostliny.net/>