

Bellucia

čeleď: Melastomataceae

Roste v tropické Americe v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky až 30m. Listy jsou kožovité, řapíkaté a mohou být drobně pilovité. Květenstvím je úžlabní vrcholík nebo lata, vlastní květy jsou 5 - 9tičetné a bílé nebo růžové. Plodem je bobule s mnoha semeny.

Bellucia acutata

Bellucia aequiloba

Bellucia beckii

Bellucia dichotoma

Bellucia egensis

Bellucia gracilis

Bellucia grossularioides

synonyma: *B. brasiliensis*, *B. circumscissa*, *B. hostmannii*, *B. macrophylla*, *B. multiflora*, *B. quinquenervia*, *B. superba*, *Blakea macrophylla*, *Blakea quinquenervia*, *Melastoma grossularioides*, *Webera quinquenervia*

oblasti: Bolívie, Brazílie, J Mexiko

Roste od Mexika po Bolívii v podobě stromu s kulatou korunou. Dorůstá výšky 3 - 25 (i 30)m. Větve jsou v mládí hranaté. Listy jsou kožovité, vejčité až obvejčité, v mládí drobně pilovité, dlouhé 15 - 35cm, široké 10 - 20cm a řapíky jsou dlouhé do 6cm. Kveté samostatnými květy nebo v obvykle 2četných vrcholících, mají 1 - 2,5cm stopky, koruna je 7 - 8mičetná, kalich široký 1,5 - 2cm s 2 - 5ti laloky a korunní lístky jsou dlouhé 2 - 2,4cm.

Bellucia huberi

synonyma: *Loreya huberi*

Bellucia imperialis

oblasti: Bolívie, Brazílie, Peru

Roste v Peru, Bolívii a Brazílii v podobě stromu. Dorůstá výšky 10m. Listy jsou vejčité, drobně

ochlupené, dlouhé do 25cm, široké 11 - 17cm a řapíky jsou dlouhé 2 - 5cm. Květenstvím je chudá lata, vlastní květy mají stopky délky do 1,5cm, kalich délky 2mm a korunní lístky jsou bílé, dlouhé 1,7 - 2cm a široké 1 - 1,5cm.

Bellucia klugii

Bellucia nigricans

synonyma: Heteroneuron nigricans, Loreya nigricans

Bellucia ovata

Bellucia pentamera

synonyma: Axinanthera macrophylla, B. aricuaizensium, B. axinanthera, B. costaricensis, B. weberbaueri

oblasti: Bolívie, Brazílie, J Mexiko

Roste od Mexika po Brazílii a Bolívii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 15m. Větve mohou být v mládí ochlupené. Listy jsou kožovité, vejčité, tupé nebo špičaté, lesklé, dlouhé 20 - 30cm, široké 6 - 18cm, na spodní straně nasivělé a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 3cm. Květenstvím je 1 - 4četný vrcholík, vlastní květy mají max. 1,5cm stopky, korunu 5 - 6 (i 7)mičetnou, kalich délky 1,5 - 2cm s 4 - 6ti laloky, korunní lístky jsou bílé nebo narůžovělé a dlouhé 1,4cm.

Bellucia riparia

synonyma: Loreya riparia

Bellucia strigosa

synonyma: Loreya quadrifolia

Bellucia subandina

oblasti: Jižní Amerika

Bellucia umbellata

synonyma: Loreya umbellata

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě nízkého stromu. Konce větví jsou hranaté. Listy jsou vejčité, špičaté, celokrajné, na žilnatině a spodní straně mírně ochlupené, dlouhé do 30cm, široké až 15cm a řapíky jsou dlouhé 2 - 3cm. Květenství je max. 20tičetné, vlastní květy mají 5 korunních lístků délky 5 - 6mm a stopky jsou dlouhé 1cm.

Bellucia weberbaueri

oblasti: Brazílie, Peru

Roste v Peru a Brazílii. Listy mají zvlněné okraje a řapíky délky 3 - 5cm. Květenstvím je chudý vrcholík, vlastní květy jsou seskupené ještě do svazečků, mají 1 - 2cm stopky, na vnější straně jsou růžové a na vnitřní bílé.

Bellucia wurdackiana

synonyma: Loreya wurdackiana

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1603>

<https://www.rostliny.net/>