

Stephania japonica

synonyma: *Cissampelos hernandiifolia*, *Clypea discolor*, *Clypea glaucescens*, *Cocculus forsteri*, *Cocculus japonicus*, *Cocculus japonicus* var. *timorensis*, *Menispermum japonicum*, *Stephania concinna*, *Stephania discolor*, *Stephania discolor* var. *hernandiifolia*, *Stephania exigua*, *Stephania forsteri*, *Stephania glaucescens*, *Stephania hallieri*, *Stephania hernandiifolia*

čeleď: Menispermaceae

oblasti: Bengálsko, Filipíny, Japonsko, Korea, Malajsie, Melanésie, Nepál, Nový Jižní Wales, Queensland, Severní teritorium, Srí Lanka, Thajsko, Tichý oceán, V Čína, Západní Austrálie

Roste od Japonska po Austrálii. Patří mezi opadavé šplhavé dřevnatějící trvalky. Pod zemí vytváří hnědožluté kořeny. Listy mohou být ochlupené, široce 3úhlé, dlouhé 4 - 17cm, široké 4 - 14cm, žilnatinu tvoří 10 - 11 žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 12cm a nasedají mimo okraj čepele. Květenství je úžlabní, dlouhé 4 - 8cm, tvoří jej prakticky přisedlé okoličnaté vrcholíky, samčí květy jsou přisedlé a mají 3 - 4 kališní i korunní lístky. Plodem je oválná oranžová až červená bobule délky 2 - 5 (i 8)mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *discolor*/*S. hernandiifolia* - Čína, Korea, Thajsko, Indie, Srí Lanka, Malajsie, Austrálie; listy na báze zakulacené, na spodní straně řídce ochlupené; květenství mají 6 - 7mipaprsčité okolíky, stopky délky 2 - 6cm, samčí květy přisedlé, mají 6 - 8 kališních lístků délky 1,5mm, 3 - 4 korunní lístky délky 1mm, samičí podobné; plody kulovité, průměru 5mm
- var. *japonica* - Malajsie, Srí Lanka, Čína, Korea, Japonsko, Tonga, Společenské ostrovy, Moluky, Filipíny; povrch holý
- var. *timoriensis* - Indie, Austrálie, Polynésie, Malesie - listy občas na konci řapíku jemně ochlupené

<https://www.rostliny.net/>