

Arrhenatherum elatius (Ovsík vyvýšený)

čeleď: Poaceae

oblasti: Alabama, Aljaška, Andalusie, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Georgia, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Keňa, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Pochází z teplejších částí Evropy. Patří mezi trvalky. Roste v trsech. Dorůstá výšky 0,5 - 1,5 (i 1,8)m. Stébla mají 3 - 5 kolének. Přisedlé listy jsou dlouhé do 40cm a 0,5 - 1cm široké. Kvete v 10 - 30cm bohatých latech s 1cm klásky se zelenými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. baeticum
- subsp. bulbosum (Ovsík vyvýšený hlíznatý) - Evropa; výška 1 - 1,2m; trsy; pod zemí vytváří malé kulovité hlízky; kvetenstvím je lata z klásků
- 'Variegatum' - výška 30 (i 50)cm; bíle proužkované listy; kvete vzácně
- subsp. elatius (Ovsík vyvýšený pravý) - výška 0,6 - 1,2m; listy ploché, krátce odstále ochlupené, pochvy zpravidla holé; kvetenství má dolní plevu 1žilnou, horní 3žilnou, osina pluchy v dolním květu je dlouhá 1 - 2cm, horní plucha má osinu velmi krátkou; louky, pastviny, okraje lesů, násypy, atp.
- f. flavescens
- subsp. nebrodense
- f. río frío
- subsp. sardoum
- f. servitii
- subsp. vulgare

Vyhovuje mu propustná písčitá půda.

<https://www.rostliny.net/>