

Centropogon solanifolius

synonyma: *Centropogon austin-smithii*, *Centropogon discolor*, *Centropogon flexuosus*, *Centropogon longipes*, *Centropogon montanus*, *Centropogon montanus* f. *subpubescens*, *Centropogon nubicola*, *Centropogon ovalifolius*, *Centropogon ovalifolius* var. *glabristamineus*, *Centropogon planchonis*, *Centropogon prostratus*, *Centropogon psilandrus*, *Centropogon riparius*, *Centropogon semperflorens*, *C. var. hirtellus*, *C. var. inconstans*, *C. var. speciosus*, *Centropogon speciosus*, *Centropogon subfalcatus*, *Centropogon xestus*, *Siphocampylus longipes*

čeleď: Campanulaceae

oblasti: Ekvádor, Kolumbie, Kostarika, Peru, Venezuela

Roste na severu Jižní Ameriky v podobě trvalky až keře, občas jako epifyt. Dorůstá výšky do 1,5m. Stonek při poranění roní bílou tekutinu. Listy jsou střídavé, vejčité, vroubkované, dlouhé 12 - 15cm a řapíkaté. Květenstvím je terminální hrozen tvořený květy s hrboletým kalichem a oranžovočervenou korunou o délce 4cm a nažloutlými laloky. Plodem je bobule.

<https://www.rostliny.net/>