

Dactylis glomerata (Srha laločnatá)

čeleď: Poaceae

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Andalusie, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Grónsko, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Portoriko, Quebec, Rhode Island, S Afrika, Severní Dakota, Severní Karolína, Střední střeozemí, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Roste v Evropě, Asii a severní Africe. Dorůstá výšky (0,15 -) 0,2 - 1,2 (i 2)m. Stonek je vzpřímený až vystoupavý. Povrch je šedozelený. Listy mají tuhé ostré okraje, délku (10 -) 20 - 45 (i 50)cm a šířku 0,4 - 1 (i 1,5cm). Kvete v letech o délce 2 - 30cm, ve skupinkách klásků, které mají za květu v obrysu 3úhlý tvar, vrchol je prakticky vzpřímený, větve kolmo odstálé, později stažené, klásky jsou nahloučené k sobě, 3 - 4 (i 5)tkvěté, dlouhé 5 - 9mm, plevy drsné, neprosvítající, zelené nebo načervenalé, dolní je 1žilná, kýl horní plevy a pluch má dlouhé i krátké přímé chlupy, pluchy na ploště dlouze ochlupené, náhle zúžené u dolních květů v osinu délky 1 - 2mm. Plodem je obilka. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Elegantissima' - výška 15cm; listy panašované
- subsp. *glomerata* (Srha laločnatá pravá) - výška 0,5 - 1m; stébla na bázi zanedbatelně cibulkatě zduřená, slabší než 5mm; pochvy listů 2řízně zploštělé; lata drsná, dlouhá až 15cm; louky, pastviny, okraje lesů
- subsp. *hackelii*
- subsp. *himalayensis*
- subsp. *hispanica*/D. *hispanica*
- subsp. *ibizensis*
- subsp. *judaica*
- subsp. *juncinella*
- subsp. *lobata*/D. *aschersoniana*
- subsp. *lusitanica*
- subsp. *marina*/D. *marina*
- subsp. *reichenbachii*
- subsp. *santai*
- subsp. *slovenica* - výška 1 - 1,8m; stébla na bázi cibulkatě zduřená, v průměru mají min. 5mm; pochvy listů mírně zploštělé; lata hladká, delší než 20cm; světlé lesy, křoviny
- subsp. *smithii*
- 'Variegata' - výška 25 - 45 (i 75)cm; listy pruhované
- subsp. *woronowii*/D. *woronowii*

Nemá speciální nároky. Patří mezi běžné druhy trav a je široce rozšířena.

<https://www.rostliny.net/>