

Koeleria (Smělek)

čeleď: Poaceae

Rod je pojmenovaný po německém botanikovi Georgovi Ludwigovi Koeleri. Dorůstá výšky 0,05 - 1,2m. Květy v kláscích tvoří vejčitou latu. Plodem je obilka.

Koeleria albescens

Koeleria altaica

synonyma: *K. eriostachya* var. *altaica*

Koeleria asiatica

synonyma: *K. alpina*, *K. altaica* var. *glabrifolia*, *K. asiatica* subsp. *atroviolacea*, *K. asiatica* subsp. *ledebourii*, *K. asiatica* var. *glabrifolia*, *K. asiatica* var. *lanuginosa*, *K. asiatica* var. *leiantha*, *K. atroviolacea*, *K. atroviolacea* var. *tsinghaica*, *K. cairnesiana*, *K. geniculata*, *K. ledebourii*, *K. mariae*

oblasti: Aljaška, Asie, Evropa, Severozápadní Teritorium, Yukon

Roste v Euroasii.

Koeleria askoldensis

synonyma: *K. cristata* subsp. *askoldensis*, *K. gracilis* var. *litorea*

Koeleria besseri

synonyma: *K. besseri* var. *convoluta*

Koeleria biebersteinii

Koeleria boliviensis

synonyma: *K. boliviensis*, *K. gracilis* subsp. *boliviensis*, *K. gracilis* var. *boliviensis*

Koeleria brevis

synonyma: *K. degenii*, *K. getica*, *K. parreisziana*, *K. splendens* var. *degenii*

Koeleria calderonii

Koeleria capensis

synonyma: *Airochloa alopecurus*, *Airochloa alopecurus* var. *brevifolia*, *Airochloa capensis*, *Airochloa convoluta*, *Airochloa parviflora* var. *capensis*, *Airochloa uniflora*, *Alopecurus capensis*, *K. alopecurus*, *K. capensis* var. *pseudonitidula*, *K. ciliata* var. *convoluta*, *K. convoluta*, *K. convoluta* var. *densiflora*, *K. convoluta* var. *deusticola*, *K. convoluta* var. *uniflora*, *K. cristata* var. *brevifolia*, *K. cristata* var.

convoluta, *K. cristata* var. *densiflora*, *K. cristata* var. *shiraensis*, *K. cristata* var. *supina*, *K. gracilis* var. *convoluta*, *K. gracilis* var. *supina*, *K. pyramidata* var. *brevifolia*, *K. pyramidata* var. *convoluta*, *K. uniflora*, *K. wildemanii*

Koeleria carolii

Koeleria caudata

synonyma: *Airochloa caudata*, *K. splendens* subsp. *caudata*

Koeleria cenisia

synonyma: *K. hirsuta* subsp. *brevifolia*, *K. mutellii*, *K. reuteri*

oblasti: Itálie

Koeleria cheesemanii

synonyma: *K. novozelandica* var. *pubiculmis*, *Trisetum cheesemanii*

Koeleria crassipes

synonyma: *K. caudata* subsp. *crassipes*, *K. caudata* var. *filifolia*, *K. crassipes* subsp. *nevadensis*, *K. crassipes* var. *nevadensis*, *K. filifolia*, *K. glauca*, *K. nevadensis*, *K. rodriguezii*, *K. splendens* var. *crassipes*

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 70cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *crassipes*
- subsp. *filifolia*

Koeleria cristata

synonyma: *K. gracilis*

oblasti: Írán, Kazachstán, Krym, Ukrajina

Koeleria delavignei

synonyma: *K. barabensis*, *K. delavignei* subsp. *barabensis*, *K. delavignei* subsp. *veresczaginii*, *K. delavignei* var. *fallax*, *K. incerta*

Koeleria embergeri

Koeleria eriostachya

synonyma: *K. albovii*, *K. albovii* subsp. *caucasica*, *K. albovii* subsp. *fominii*, *K. albovii* var. *buschiana*, *K. albovii* var. *caucasica*, *K. albovii* var. *denudata*, *K. albovii* var. *fominii*, *K. albovii* var. *glabriculumis*, *K. buschiana*, *K. carniolica*, *K. caucasica*, *K. cristata* var. *hirsuta*, *K. eriostachya*, *K. eriostachya* f.

denudata, K. eriostachya f. glabriculumis, K. eriostachya subsp. albovii, K. eriostachya subsp. caucasica, K. eriostachya subsp. fominii, K. eriostachya subsp. schroeteriana, K. eriostachya var. carniolica, K. fominii, K. gracilis var. buschiana, K. schroeterana, K. schroeteriana, K. schroeteriana var. glabriglumis, K. splendens var. albanica, K. tuzsonii, K. tuzsonii var. albanica

oblasti: Írán, Itálie, Švýcarsko

Koeleria fueguina

synonyma: Trisetum toluicense var. tomentosum, Trisetum tomentosum

Koeleria glauca (Smělek sivý)

synonyma: Aira glauca, Airochloa glauca, Dactylis glauca, K. albescens var. maritima, K. arenaria, K. borysthenica, K. cristata subsp. arenaria, K. cristata var. glauca, K. eriostachya var. pyrenaica, K. glauca subsp. pohleana, K. glauca subsp. sabuletorum, K. glauca var. intermedia, K. glauca var. pohleana, K. glauca var. valdevestita, K. macrantha subsp. glauca, K. maritima, K. pohleana, K. pyrenaica, K. rochelii, K. sabuletorum, K. schroeteriana var. pyrenaica, Poa glauca

oblasti: Česká republika, Německo, Polsko, V Evropa, Z Asie

Pochází z východní Evropy a západní Asie. Patří mezi trsnaté trvalky. Dorůstá výšky 30 - 50 (i 70)cm. Stonek je při bázi cibulkatě ztlustlý, sterilní výhonky vyrůstají po 2 - 3ks ve společném obalu ze starých odumřelých pochev a vyrůstá z nich i min. 5 čepelí. Čárkovité listy jsou modrozelené, dlouhé 2 - 6cm, pochvy na bázi stébel se ve stáří vláknitě třepí. Květenství je dlouhé 2 - 11cm, je jim kompaktně stažený lichoklas, je tvořený 4 - 5mm klásky s 1 - 3 květy a plevy i pluchy jsou tupé, pluchy občas s osinkatou špičkou. Patří mezi chráněné druhy C2. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Pygmaea' - zakrslý šedozelený trs

Potřebuje pouze minimální závlivku, plné slunce a písčitou dobře propustnou půdu chudou na živiny.

Množí se dělením nebo semeny.

Koeleria grandis

synonyma: K. polonica

Koeleria heribaudii

Koeleria hirsuta

synonyma: Aira hirsuta, Airochloa hirsuta, K. flavovirens, K. hirsuta var. schinzii, K. hirta, K. montana, K. schinzii

oblasti: Itálie, Švýcarsko

Koeleria inaequaliglumis

Koeleria insubrica

oblasti: Itálie

Koeleria karavajevii

Koeleria kurtzii

synonyma: *K. argentina*, *K. bergii* var. *fallacina*, *K. gracilis* var. *andicola*, *K. grisebachii*, *K. grisebachii* var. *catamarcensis*, *K. grisebachii* var. *riojensis*, *K. grisebachii* var. *typica*, *K. hieronymi*, *K. kurtzii* var. *mollis*, *K. lilloi*, *K. niederleinii*, *K. niederleinii* var. *mutica*, *K. niederleinii* var. *pseudobergii*, *K. pseudocristata* var. *andicola*, *Trisetum kurtzii*, *Trisetum subaristatum*

Koeleria litvinowii

synonyma: *K. argentea*, *K. argentea* var. *nepalensis*, *K. enodis*, *K. hosseana*, *K. hosseana* var. *tafelii*, *K. litvinowii* subsp. *argentea*, *K. litvinowii* var. *tafelii*, *K. nepalensis*, *Trisetum litvinowii*, *Trisetum litvinowii* subsp. *argentea*, *Trisetum litvinowii* var. *argentea*, *Trisetum litvinowii* var. *argenteum*

oblasti: Afganistán, Ázád Kašmír, Balúčistán

Roste v Afganistánu a Pákistánu jako trvalka. Dorůstá výšky 25 - 45cm. Stonek je jednoduchý, vzpřímený až vystoupavý. Listy mohou být řídce ochlupené, dlouhé 3,5 - 10cm a široké 2 - 4mm. Květenstvím je podlouhlá lata délky 3 - 7cm a klásky jsou 2 - 3květe.

Koeleria lobata

synonyma: *Aira grandiflora*, *Airochloa grandiflora*, *Dactylis lobata*, *K. australis*, *K. bivestita*, *K. borbasii*, *K. callieri*, *K. crassa*, *K. cristata* f. *robusta*, *K. cristata* var. *canescens*, *K. cristata* var. *robusta*, *K. cristata* var. *splendens*, *K. dasyphylla*, *K. grandiflora*, *K. grandiflora* subsp. *skorpilii*, *K. grandiflora* var. *subaristata*, *K. mitrushii*, *K. moldavica*, *K. paparistoi*, *K. robusta*, *K. skorpilii*, *K. splendens*, *K. splendens* subsp. *subcaudata*, *K. splendens* var. *callieri*, *K. splendens* var. *canescens*, *K. splendens* var. *pseudorigidula*, *K. splendens* var. *pubescens*, *K. splendens* var. *subcaudata*, *K. subaristata*, *K. subcaudata*

oblasti: Itálie, Sierra Nevada (Španělsko)

Dorůstá výšky 60cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *dasyphylla*
- subsp. *nevadensis*

Koeleria lucana

oblasti: Itálie

Koeleria luerssenii

synonyma: *K. gracilis* subsp. *luerssenii*, *K. grossheimiana*, *K. luerssenii* subsp. *grossheimiana*, *K. monantha*

Koeleria macrantha (Smělek štíhlý)

synonyma: *Achaeta geniculata*, *Aira bulbosa*, *Aira cristata*, *Aira dactyloides*, *Aira macrantha*, *Airochloa albescens*, *Airochloa cristata*, *Airochloa parviflora*, *Dactylis cristata*, *K. albescens*, *K. albescens* var. *glabra*, *K. albida*, *K. alpigena*, *K. alpigena* subsp. *mannagettae*, *K. alpigena* var. *mannagettae*, *K. ambigua*, *K. arctica*, *K. arkansana*, *K. aschersoniana*, *K. australiensis*, *K. australiensis* var. *aristata*, *K. australiensis* var. *maxima*, *K. bitzenachica*, *K. britannica*, *K. brittanica* var. *pontarlieri*, *K. calarashica*, *K. californica*, *K. chakassica*, *K. compacta*, *K. cristata*, *K. cristata* f. *amurensis*, *K. cristata* f. *aristulata*, *K. cristata* f. *aurea*, *K. cristata* f. *contracta*, *K. cristata* f. *depauperata*, *K. cristata* f. *dominiana*, *K. cristata* f. *festucoides*, *K. cristata* f. *flaccida*, *K. cristata* f. *grandiflora*, *K. cristata* f. *includens*, *K. cristata* f. *lanata*, *K. cristata* f. *mandshurica*, *K. cristata* f. *minutiflora*, *K. cristata* f. *pubiculmis*, *K. cristata* f. *scabriglumis*, *K. cristata* f. *subglabra*, *K. cristata* f. *subpubiculmis*, *K. cristata* f. *subsetacea*, *K. cristata* subsp. *chakassica*, *K. cristata* subsp. *helvetica*, *K. cristata* subsp. *hirsutiflora*, *K. cristata* subsp. *krylovii*, *K. cristata* subsp. *macrantha*, *K. cristata* subsp. *mongolica*, *K. cristata* subsp. *pseudocristata*, *K. cristata* subsp. *repens*, *K. cristata* subsp. *seminuda*, *K. cristata* subsp. *transiliensis*, *K. cristata* var. *albescens*, *K. cristata* var. *amurensis*, *K. cristata* var. *argentea*, *K. cristata* var. *avenacea*, *K. cristata* var. *colorata*, *K. cristata* var. *desertorum*, *K. cristata* var. *elatior*, *K. cristata* var. *elegantula*, *K. cristata* var. *geniculata*, *K. cristata* var. *glabra*, *K. cristata* var. *gracilis*, *K. cristata* var. *gracillima*, *K. cristata* var. *grandiflora*, *K. cristata* var. *gypsacea*, *K. cristata* var. *intercedens*, *K. cristata* var. *longifolia*, *K. cristata* var. *macrantha*, *K. cristata* var. *major*, *K. cristata* var. *oregona*, *K. cristata* var. *pilifera*, *K. cristata* var. *pinetorum*, *K. cristata* var. *poaeformis*, *K. cristata* var. *pseudocristata*, *K. cristata* var. *pubescens*, *K. cristata* var. *pubiculmis*, *K. cristata* var. *sabulosa*, *K. cristata* var. *seminuda*, *K. cristata* var. *tenuifolia*, *K. cristata* var. *tokiensis*, *K. csatoi*, *K. elatior* f. *glabrescens*, *K. elegantula*, *K. eminens*, *K. fenzliana*, *K. flexilis*, *K. glaucovirens*, *K. glaucovirens* var. *jankae*, *K. gracilis*, *K. gracilis* f. *aristulata*, *K. gracilis* f. *aurea*, *K. gracilis* f. *biflora*, *K. gracilis* f. *colorata*, *K. gracilis* f. *congesta*, *K. gracilis* f. *contracta*, *K. gracilis* f. *densevestita*, *K. gracilis* f. *festucoides*, *K. gracilis* f. *filifolia*, *K. gracilis* f. *flaccida*, *K. gracilis* f. *glabra*, *K. gracilis* f. *grandiflora*, *K. gracilis* f. *includens*, *K. gracilis* f. *lanata*, *K. gracilis* f. *laxa*, *K. gracilis* f. *mandshurica*, *K. gracilis* f. *pubescens*, *K. gracilis* f. *quadriflora*, *K. gracilis* f. *scabriglumis*, *K. gracilis* f. *subpubiglumis*, *K. gracilis* f. *triflora*, *K. gracilis* f. *washingtonensis*, *K. gracilis* subsp. *britannica*, *K. gracilis* subsp. *idahensis*, *K. gracilis* subsp. *macrura*, *K. gracilis* subsp. *nitida*, *K. gracilis* subsp. *polyantha*, *K. gracilis* subsp. *pseudocristata*, *K. gracilis* subsp. *seminuda*, *K. gracilis* subsp. *sibirica*, *K. gracilis* subsp. *transsilvanica*, *K. gracilis* var. *amurensis*, *K. gracilis* var. *arctica*, *K. gracilis* var. *arenicola*, *K. gracilis* var. *avenacea*, *K. gracilis* var. *borbasii*, *K. gracilis* var. *breviculmis*, *K. gracilis* var. *britannica*, *K. gracilis* var. *californica*, *K. gracilis* var. *californiensis*, *K. gracilis* var. *caudata*, *K. gracilis* var. *dasyclada*, *K. gracilis* var. *depauperata*, *K. gracilis* var. *elatior*, *K. gracilis* var. *flaccida*, *K. gracilis* var. *gracillima*, *K. gracilis* var. *gypsacea*, *K. gracilis* var. *hirsutiflora*, *K. gracilis* var. *hummelii*, *K. gracilis* var. *intercedens*, *K. gracilis* var. *latifrons*, *K. gracilis* var. *laxa*, *K. gracilis* var. *longifolia*, *K. gracilis* var. *mandshurica*, *K. gracilis* var. *minutiflora*, *K. gracilis* var. *missouriana*, *K. gracilis* var. *mukdenensis*, *K. gracilis* var. *munita*, *K. gracilis* var. *oregana*, *K. gracilis* var. *pilifera*, *K. gracilis* var. *pseudocristatoides*, *K. gracilis* var. *pseudonitida*, *K. gracilis* var. *pubiculmis*, *K. gracilis* var. *rigidissima*, *K. gracilis* var. *rohlena*, *K. gracilis* var. *rossica*, *K. gracilis* var. *sabulosa*, *K. gracilis* var. *sintenisii*, *K. gracilis* var. *sublanuginosa*, *K. gracilis* var. *subrepens*, *K. gracilis* var. *tokiensis*, *K. helvetica*, *K. idahoensis*, *K. jankae*, *K. janoensis*, *K. javorkae*, *K. krylovii*, *K. kurdica*, *K. kurdica* var. *bitzenachica*, *K. latifrons*, *K. longifolia*, *K. macrantha* f. *aristulata*, *K. macrantha* f. *lanata*, *K. macrantha* f. *longifolia*, *K. macrantha* subsp. *pseudocristata*, *K. macrantha* var. *arenicola*, *K. macrantha* var. *borbasii*, *K. macrantha* var. *borbasli*, *K. macrantha* var. *colorata*, *K. macrantha* var. *eminens*, *K. macrantha* var. *fenzliana*, *K. macrantha* var. *flaccida*, *K. macrantha* var. *pseudocristata*, *K. macrantha* var. *rohlena*, *K. macrura*, *K. macrura* f. *biflora*, *K. macrura* f. *quadriflora*, *K. macrura* f.

triflora, K. managettae, K. mukdenensis, K. nitida, K. nitida f. colorata, K. nitida f. congesta, K. nitida f. filifolia, K. nitida f. pubescens, K. nitida var. arkansana, K. nitida var. californica, K. nyaradyi, K. oregana, K. pallida, K. poiformis, K. polyantha, K. polyantha var. californica, K. pontarlieri, K. pseudocristata, K. pseudocristata f. pubescens, K. pseudocristata var. californica, K. pseudoglauca subsp. csatoi, K. pseudoglauca subsp. fenzliana, K. robinsoniana, K. robinsoniana var. australis, K. sclerophylla, K. sclerophylla subsp. theodoriana, K. seminuda, K. sibirica, K. soongarica, K. supra-arenaria, K. talievii, K. taurica, K. tenuipes, K. theodoriana, K. tokiensis, K. tokiensis subsp. mongolica, K. transiliensis, K. transsilvanica, K. transsilvanica subsp. tenuipes, K. transsilvanica var. tenuipes, K. velenovskyi, K. wolgensis, K. yukonensis, Melica gmelinii, Poa aristata, Poa cristata, Poa nitida

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Arizona, Arkansas, Ázád Kašmír, Balúčistán, Britská Kolumbie, Chajbar Paštúnchwá, Česká republika, Delaware, Gilgit-Baltistán, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New York, Nové Mexiko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Paňdžáb (pakistánský), Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rumunsko, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Sibiř, Slovensko, Švýcarsko, Texas, Ukrajina, Utah, V Karpaty, Vermont, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon

Roste v teplejších oblastech severní polokoule jako trvalka. Dorůstá výšky (10 -) 20 - 50 (i 70)cm. Lodyha je vzpřímená nebo vystoupavá. Listy jsou krátce chlupaté včetně pochev, lodyžní bývají zpravidla svinuté, dlouhé 15 - 20cm, široké 1 - 2,5 (i 3)mm, Květenstvím je úzký válcovitě stažený lichoklas délky 2 - 10cm, klásky jsou 2 (i 3)květé, stříbřitě zelené, nahnědlé nebo narůžověle fialové a dlouhé 3,5 - 5 (i 6)mm. Plodem je obilka.

Vyhovují ji skalnaté stráně, stepi a písčité půdy.

Koeleria mendocinensis

synonyma: K. grisebachii var. mendocinensis

Koeleria micrathera

synonyma: K. philippiana, Leptophyllochloa micrathera, Trisetum aereanthum, Trisetum araeanthum, Trisetum brachyatherum, Trisetum depauperatum, Trisetum laxiflorum, Trisetum laxum, Trisetum micratherum, Trisetum nemorosum

Koeleria narbonnensis

synonyma: K. gracilis subsp. narbonnensis

Koeleria nitidula

synonyma: K. cristata f. glabrescens, K. gracilis f. glabrescens, K. gracilis var. obscura, K. macrantha f. glabrescens, K. nitidula var. obscura, K. penzesii, K. pilatii

oblasti: Balkánský poloostrov, Írán

Pochází z Balkánského poloostrova. Listy mají pochvy zcela holé.

Koeleria novozelandica

synonyma: *K. gintlilii*, *K. novozelandica* var. *parvula*, *K. novozelandica* var. *typica*, *K. superba*

Koeleria permollis

synonyma: *Airochloa permollis*, *K. bergii*, *K. bergii* var. *aristulata*, *K. bergii* var. *minor*, *K. permollis*

oblasti: Střední Argentina

Roste v Argentině.

Koeleria pontarlieri

synonyma: *K. albescens* subsp. *pontarlieri*

Koeleria praeandina

Koeleria pseudocristata

Dorůstá výšky do 80cm. Stébla jsou pod latou ochlupená. Lodyžní listy jsou široké 2mm. Květenstvím je lata, klásky má 2 - 3květé, dlouhé 4 - 5mm a mírně lesklé.

Koeleria pubescens

oblasti: Katalánsko

Koeleria pyramidata (Smělek jehlancovitý)

synonyma: *Aira gracilis*, *Dactylis paleacea*, *K. ciliata*, *K. ciliata* f. *rigidiuscula*, *K. ciliata* var. *rigidiuscula*, *K. cristata* var. *montana*, *K. cristata* var. *pyramidata*, *K. exaltata*, *K. genevensis*, *K. gigantea*, *K. glabra*, *K. grandis*, *K. grandis* var. *gacilescens*, *K. interrupta*, *K. kernerii*, *K. lamarckii*, *K. macrantha* var. *montana*, *K. macranthera*, *K. mollis*, *K. mollis* var. *rigidiuscula*, *K. montana*, *K. polonica*, *K. pyramidata* subsp. *montana*, *K. pyramidata* var. *ciliata*, *K. pyramidata* var. *danica*, *K. pyramidata* var. *rigidiuscula*, *K. tristis*, *Poa pyramidata*

oblasti: Česká republika, Itálie, Karpaty, Katalánsko, Německo, Polsko, Švýcarsko, V Evropa

Pochází ze severní a východní Evropy. Dorůstá výšky 0,30 - 0,6 (i 1)m. Lodyžní listy bývají ploché, holé, široké 2 - 3mm, na bázi a na okraji mají 0,5 - 1,5mm brvy a pochvy jsou holé, občas nejspodnější krátce ochlupené. Květenstvím je přechod mezi lichoklasem a úzkou jehlancovitou latou, klásky jsou 2 - 5tkvěté a dlouhé 5,5 - 7mm.

Vyhovují mu i sušší půdy s menším obsahem živin.

Koeleria rhodopea

Koeleria rigorum

Koeleria seminuda

Koeleria skrjabinii

Koeleria splendens

synonyma: *K. bivestita*, *K. dasyphylla*, *K. subaristata*

oblasti: Itálie, Katalánsko

Koeleria thonii

Koeleria tzvelevii

Koeleria vallesiana

synonyma: *Aira valesiaca*, *Aira vallesiana*, *Airochloa pubescens*, *Airochloa vallesiana*, *Brachystylus setaceus*, *Festuca splendens*, *K. alpicola*, *K. aurata*, *K. castellana*, *K. castellana* var. *velutina*, *K. cristata* var. *pectinata*, *K. epauneroi*, *K. gandreanszkyi*, *K. langeana*, *K. linkii*, *K. narbonnensis*, *K. pectinata*, *K. scheuchzeri*, *K. setacea*, *K. setacea* var. *abbreviata*, *K. setacea* var. *glabra*, *K. setacea* var. *intermedia*, *K. setacea* var. *pubescens*, *K. setacea* var. *quadriflora*, *K. tuberosa*, *K. tuberosa* var. *setacea*, *K. vallesiana*, *K. vallesiana* subsp. *abbreviata*, *K. vallesiana* subsp. *alpicola*, *K. vallesiana* subsp. *castellana*, *K. vallesiana* subsp. *humilis*, *K. vallesiana* subsp. *mediterranea*, *K. vallesiana* var. *abbreviata*, *K. vallesiana* var. *alpicola*, *K. vallesiana* var. *intermedia*, *K. vallesiana* var. *mediterranea*, *K. vallesiana* var. *minoriflora*, *K. villosa*, *Poa pectinacea*, *Poa pectinata*, *Poa vallesiana*

oblasti: Andalusie, Itálie, Katalánsko, Švýcarsko

Dorůstá výšky 45cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *alpicola*
- subsp. *vallesiana*

Koeleria ventanicola

Koeleria vurilochensis

synonyma: *K. bergii* var. *patagonica*, *K. vurilochensis* var. *patagonica*

Koeleria x aschersoniana

synonyma: *K. x soongarica*

Koeleria x hungarica

Koeleria x mixta

Koeleria x wilczekiana

Další informace:

<http://bambusy-travy.atlasrostlin.cz/smelek-sivy>

<http://botany.cz/cs/koeleria-glauca/>

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C4%9Blek>

<http://www.agrostis.cz/?pg=atlas-trav-35>

<http://www.garten.cz/e/cz/1092-koeleria-glauca-smelek-sivy/>

<https://www.rostliny.net/>