

Melica (Strdivka)

čeleď: Poaceae

Pochází zpředevším z mírného pásma severní polokoule. Patří mezi trvalky. Výška se pohybuje obvykle v rozmezí 0,10 - 1,5m. Listy mají šířku do 1,5cm. Kvete v kláscích tvořících hrozen nebo latu. Plodem je obilka.

Melica altissima (Strdivka vysoká)

synonyma: *M. altissima* var. *atropurpurea*, *M. altissima* var. *interrupta*, *M. sibirica*

oblasti: Balkánský poloostrov, Írán, J Ural, Kavkaz, Maďarsko, Malá Asie (Anatolie), Mexiko, Německo, New York, Oklahoma, Ontario, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Střední Rusko, Švédsko, Čan-šan, Ukrajina, Z Rusko

Roste od střední Evropy po střední Rusko v trsech. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,6 - 1,6 (i 2)m. Stébla jsou přímá, hrubá, rýhovaná a kolénkatá. Listy jsou dlouhé 10 - 30cm, široké 0,5 - 1,5cm a mají blanitý 4 - 5mm jazýček. Květenstvím je hustý válcovitý u báze zpravidla přetrhovaný lichoklas délky 10 - 20cm, tvoří jej více než 20 stopkatých klásků světlé barvy, délky 0,7 - 1cm a tvoří jej 2 obouphlavné květy. Plodem je obilka délky 3mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Purpurea' - klásky růžovofialové

Vyhovují ji pahorkatiny, kamenité půdy, suťové listnaté lesy, stráně, atp.

Melica amethystina

synonyma: *Dalucum bauhinii*, *M. bauhinii*, *M. litoralis*, *M. setacea*

oblasti: Itálie, Katalánsko

Melica animarum

Melica argentata

synonyma: *M. ampla*, *M. argentata* var. *breviglumis*, *M. argentea*, *M. glabra*, *M. nitida*, *M. tortuosa*, *M. violacea* var. *argentata*

Melica argyrea

synonyma: *M. argyrea* f. *pilosa*, *M. argyrea* var. *pilosa*, *M. papilionacea* var. *laxiflora*

Melica aristata

synonyma: *Bromelica aristata*

oblasti: Kalifornie, Kentucky, Nevada, Oregon, Washington

Pochází ze západu USA. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky do 1,2m.

Melica arzivencoi

Melica bocquetii

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 60cm.

Melica bonariensis

synonyma: *M. papilionacea* var. *violacea*

Melica brasiliiana

synonyma: *M. aurantiaca*, *M. aurantiaca* f. *violacea*, *M. aurantiaca* subsp. *cymbalaria*, *M. aurantiaca* var. *mucronata*, *M. aurantiaca* var. *tandilensis*, *M. brasiliiana* f. *tandilensis*, *M. brasiliiana* var. *aurantiaca*, *M. mucronata*, *M. papilionacea*, *M. spectabilis*, *M. tandilensis*

oblasti: Brazílie

Melica brevicoronata

Melica bulbosa

synonyma: *Bromelica bulbosa*, *M. bella*, *M. bella* subsp. *intonsa*, *M. bulbosa* var. *caespitosa*, *M. bulbosa* var. *inflata*, *M. bulbosa* var. *intonsa*, *M. inflata*, *M. poioides* var. *inflata*

oblasti: Britská Kolumbie, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Oregon, Saskatchewan, Texas, Utah, Washington, Wyoming

Pochází ze západu Severní Ameriky. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky do 1m.

Melica californica

synonyma: *M. bulbosa*, *M. californica* var. *nevadensis*, *M. longiligula*

oblasti: Kalifornie, Oregon

Pochází z Oregonu a Kalifornie. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky do 1,3m.

Melica canariensis

synonyma: *M. magnolii* var. *gigantea*

Melica cepacea

synonyma: *Bromelica cepacea*, *Festuca cepacea*

Melica chilensis

synonyma: *M. adhaerens*, *M. adhaerens* var. *tenuis*, *M. andina*, *M. andina* var. *laxissima*, *M. andina* var. *trinervis*, *M. mandonii*, *M. pilgeriana*, *M. popoviciana*, *M. weberbaueri* var. *tenuis*

Melica ciliata (Strdivka brvitá)

synonyma: *Arundo ciliata*, *Beckeria ciliata*, *Beckeria montana*, *Claudia ciliata*, *Dalucum ciliatum*, *Lasiagrostis variegata*, *M. balansae*, *M. bauhinii*, *M. bossieri*, *M. caespitosa*, *M. cappadocica*, *M. chrysolepis*, *M. ciliata* f. *aequiglumis*, *M. ciliata* f. *flavescens*, *M. ciliata* f. *glabrata*, *M. ciliata* f. *latifolia*, *M. ciliata* f. *pappii*, *M. ciliata* f. *violacea*, *M. ciliata* subsp. *glauca*, *M. ciliata* subsp. *magnolii*, *M. ciliata* subsp. *micrantha*, *M. ciliata* subsp. *monticola*, *M. ciliata* subsp. *nebrodensis*, *M. ciliata* subsp. *taurica*, *M. ciliata* var. *aequiglumis*, *M. ciliata* var. *brachyantha*, *M. ciliata* var. *chrysolepis*, *M. ciliata* var. *elata*, *M. ciliata* var. *flavescens*, *M. ciliata* var. *glabrata*, *M. ciliata* var. *major*, *M. ciliata* var. *micrantha*, *M. ciliata* var. *nebrodensis*, *M. ciliata* var. *taurica*, *M. ciliata* var. *tomentella*, *M. ciliata* var. *varia*, *M. ciliata* var. *violacea*, *M. ciliata* var. *vulgaris*, *M. colorata*, *M. cretica*, *M. cristata*, *M. flavescens*, *M. glauca*, *M. laxiflora*, *M. linnaei*, *M. lutescens*, *M. magnolii*, *M. micrantha*, *M. monticola*, *M. nebrodensis*, *M. nebrodensis* var. *magnolii*, *M. provincialis*, *M. pubescens*, *M. simulans*, *M. taurica*, *M. taurica* subsp. *monticola*, *M. tinei*, *M. transsilvanica* var. *glabrata*, *M. typhina*, *Verinea pterostachys*

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Írán, Itálie, JZ Rusko, Katalánsko, Kazachstán, Korsika, Kréta, Libanon, Maďarsko, Makaronésie, Makedonie, Maroko, Moldávie, Německo, Portugalsko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Washington

Pochází ze severní Afriky, střední a jižní Evropy. Patří mezi trvalky a roste v trsech. Dorůstá výšky 20 - 70 (i 90)cm. Barva je šedozelená a povrch holý. Stébla jsou přímá, tenká, v horní části drsná. Listy mají šířku 1 - 4mm, bývají svinuté, tuhé, šedozelené, holé s až 4mm a pochvy všech listů jsou holé. Kvete v bílých nebo našedlých kláscích vytvářející řidší lichoklas délky 4 - 8 (i 20)cm. Plodem je světleběžová obilka. Patří mezi ohrožené druhy C3. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *ciliata*/var. *ciliata* (Strdivka brvitá pravá)
- subsp. *magnolii*
- var. *micrantha*

Vyhovuje ji suchá vápnitá půda, stepi, kroviny atp. a plné slunce nebo polostín.

Melica commersonii

synonyma: *M. commutata*, *M. violacea* var. *commersonii*, *M. violacea* var. *commutata*, *M. violacea* var. *glabrior*, *M. violacea* var. *pallida*

Melica cupanii

synonyma: *M. cupanii* var. *turkestanica*, *M. humilis*, *M. persica* subsp. *cupanii*

oblasti: Andalusie, Itálie

Dorůstá výšky 70cm.

Melica decipiens

synonyma: *M. violacea* f. *mucronata*

Melica decumbens

Melica dendroides

synonyma: *M. caffrorum* var. *decumbens*, *M. decumbens*, *M. neesii*

Melica eligulata

synonyma: *M. angustifolia*, *M. angustifolia* f. *planifolia*, *M. cupanii* var. *eligulata*, *M. minuta* var. *eligulata*, *M. ramosa* var. *eligulata*

oblasti: Írán

Melica eremophila

synonyma: *M. monantha*

Melica frutescens

oblasti: Arizona, Kalifornie

Melica fugax

synonyma: *M. fugax* subsp. *madophylla*, *M. fugax* var. *inexpansa*, *M. fugax* var. *macbridei*, *M. macbridei*

oblasti: Idaho, Kalifornie, Nevada, Oregon, Washington

Pochází ze západu USA. Dorůstá výšky do 60cm.

Vyhovuje ji vulkanická půda.

Melica geyeri

synonyma: *Bromelica geyeri*, *Bromelica geyeri* var. *howellii*, *Bromus muticus*, *Glyceria bulbosa*, *M. bromoides*, *M. bromoides* var. *howellii*, *M. geyeri* var. *aristulata*

oblasti: Britská Kolumbie, Kalifornie, Montana, Nevada, Oregon

Pochází z Oregonu a Kalifornie. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky do 2m.

Melica glabrescens

synonyma: *M. violacea* var. *glabrescens*

Melica grandiflora

synonyma: *M. komarovii*, *M. nutans* subsp. *grandiflora*, *M. nutans* var. *argyrolepis*

Melica harfordii

synonyma: Bromelica harfordii, Bromelica harfordii var. minor, M. harfordii subsp. tenuior, M. harfordii var. minor, M. harfordii var. tenuis, M. harfordii var. viridifolia

oblasti: Britská Kolumbie, Kalifornie, Oregon, Washington

Pochází ze západu Severní Ameriky. Dorůstá výšky do 1,2m.

Melica hitchcockii

Melica hunzikeri

Melica hyalina

synonyma: M. aurantiaca var. montevidensis, M. brasiliiana f. truncata, M. hyalina var. truncata, M. montevidensis, M. papilionacea var. hyalina

Melica imperfecta

synonyma: M. colpodoides, M. imperfecta var. flexuosa, M. imperfecta var. minor, M. imperfecta var. pubens, M. imperfecta var. refracta, M. imperforata, M. panicoides, M. parishii, M. poioides

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada

Pochází z jihozápadu USA. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 1,2m.

Melica kozlovii

Melica lilloi

synonyma: M. decumbens

Melica longiflora

synonyma: M. berteroana, M. berteroana f. violacea, M. berteroana var. exaltata, M. berteroana var. pilosula, M. berteroana var. puberula, M. exaltata, M. flava, M. flava var. violacea, M. hirta, M. laxiflora f. hirta, M. laxiflora var. glabra, M. laxiflora var. hirsuta, M. laxiflora var. hirta, M. laxiflora var. longiflora, M. laxiflora var. pilosula

Melica longiligulata

Melica macra

synonyma: M. macra var. pilosa

Melica minor

synonyma: M. subenervis

Melica minuta

synonyma: *Dalucum majus*, *Dalucum ramosum*, *M. anceps*, *M. arrecta*, *M. aspera*, *M. australis*, *M. baetica*, *M. cyrenaica*, *M. guruguensis*, *M. major*, *M. minuta* subsp. *arrecta*, *M. minuta* subsp. *major*, *M. minuta* subsp. *saxatilis*, *M. minuta* var. *amana*, *M. minuta* var. *latifolia*, *M. minuta* var. *ramosa*, *M. minuta* var. *saxatilis*, *M. montana*, *M. pyramidalis*, *M. pyramidalis* subsp. *arrecta*, *M. ramosa*, *M. ramosa* subsp. *major*, *M. ramosa* subsp. *saxatilis*, *M. rimarum*, *M. saxatilis*, *M. sorrentinii*

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Chorvatsko, Francie, Itálie, Izrael, Jordánsko, Katalánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Makaronésie, Makedonie, Maroko, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Sýrie, Tunisko, Turecko

Dorůstá výšky 0,75 (i 1)m. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. *latifolia*
- subsp. *major*
- subsp. *minuta*

Melica mollis

Melica montezumae

synonyma: *M. alba*

oblasti: Texas

Melica mutica

synonyma: *Lolium canadense*, *Lolium temulentum* var. *canadense*, *M. altissima*, *M. diffusa*, *M. glabra*, *M. muehlenbergiana*, *M. mutica* f. *diffusa*, *M. mutica* var. *diffusa*, *M. mutica* var. *glabra*, *M. racemosa*, *M. rariflora*, *M. speciosa*

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, New Jersey, Oklahoma, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Melica nitens

synonyma: *M. diffusa* var. *nitens*, *M. scabra*

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Kolorado, Maryland, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Melica nutans (Strdivka nicí)

synonyma: *Aira nutans*, *Dalucum nutans*, *M. montana*, *M. nutans* f. *fissurae*, *M. nutans* subsp. *amurensis*, *M. picta* f. *fissurae*, *Poa nutans*

oblasti: Česká republika, Itálie, Kašmír, Katalánsko, Německo, Pákistán, Polsko

Roste v Euroasii s výjimkou severu a jihu Evropy v řídkých trsech jako trvalka. Dorůstá výšky (20 -) 30 - 60cm. Pod zemí vytváří dlouhé plazivé oddenky. Listy jsou úzce kopinaté, drsné, zelené, zpravidla načervenalé, dlouhé 4 - 20cm, široké 2 - 6mm, mají hnědé max. 0,5mm límečkové jazýčky. Kvete ve 4 - 10 (i 20)cm latě hnědými převážně skloněnými jednostrannými klásy délky 6 - 8mm se 2 - 3mi fertilními a 1 sterilním květem a plevy jsou hnědočervené. Plodem je obilka.

Vyhovují ji lesy, křoviny i paseky.

Melica onoei

synonyma: M. kumana, M. matsumurae, M. scaberrima var. micrantha

oblasti: Ázad Kašmír, Chajbar Paštúnchwá, Čína, Japonsko

Roste v Pákistánu, Číně a Japonsku jako vzpřímená nebo vystoupavá trvalka. Dorůstá výšky 0,75 - 1,1m. Pod zemí vytváří oddenek. Listy jsou čárkovité, dlouhé 20 - 35cm, široké 0,35 - 1,1cm a nejšířší jsou uprostřed. Květenstvím je převislá lata délky 20 - 35cm, klásy jsou dlouhé 6,5 - 8mm a mají 1 - 5mm stopku.

Melica pappiana

Melica parodiana

Melica patagonica

synonyma: M. stuckertii var. tenuis

Melica paulsenii

synonyma: M. litoralis var. paulsenii, M. litoralis var. werdermannii

Melica penicillaris

Melica persica

synonyma: M. armena, M. atropatana, M. breviflora, M. canescens, M. cupani var. hohenackeri, M. cupani var. inaequiglumis, M. cupani var. vestita, M. cupanii var. breviflora, M. cupanii var. canescens, M. cupanii var. hohenackeri, M. cupanii var. inaequiglumis, M. cupanii var. pannosa, M. cupanii var. vestita, M. glaucescens, M. hohenackeri, M. inaequiglumis, M. inaequiglumis var. supratomentosa, M. jacquemontii, M. jacquemontii subsp. canescens, M. jacquemontii subsp. hohenackeri, M. kermanica, M. kotschy, M. lanata, M. micrantha var. inaequiglumis, M. pannosa, M. pannosa var. schimperi, M. persica subsp. atropatana, M. persica subsp. canescens, M. persica subsp. inaequiglumis, M. persica subsp. jacquemontii, M. persica var. caspica, M. schimperi, M. schischkinii, M. sinaica, M. trachyantha, M. transsilvanica subsp. atropatana, M. vestita, M. viridis, M. woronowii

oblasti: Afganistán, Ázad Kašmír, Balúčistán, Chajbar Paštúnchwá, Gilgit-Baltistán, Írán, J Rusko, Kazachstán, SZ Indie, Turecko

Roste od Turecka po Afganistán, Pákistán, Indii a Rusko jako vzpřímená nebo vystoupavá trvalka v

trsech o průměru až 45cm. Dorůstá výšky 15 - 50cm. Pod zemí vytváří oddenek. Listy jsou čárkovité, dlouhé 5 - 15cm a široké 2 - 4mm. Květenstvím je lata délky 3,5 - 12cm a klásky jsou dlouhé 0,55 - 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *inaequiglumis*
- subsp. *persica*

Melica picta (Strdivka zbarvená)

synonyma: *M. nutans* var. *picta*, *M. picta* f. *pilosa*, *M. viridiflora*

oblasti: Arménie, Chorvatsko, Česká republika, Finsko, Gruzie, Írán, Itálie, JZ Rusko, Malá Asie (Anatolie), Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, Ukrajina, Z Rusko

Roste zejména ve střední a východní Evropě v hustých trsech. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 30 - 60cm. Pod zemí vytváří dlouze plazivý oddenek. Povrch je šedo-zelený. Stébla jsou téměř přímá, tenká. Spodní listy mají nařízlavělé pochvy, čepel je na spodní straně drsná, má šířku 3 - 4mm, jazýček je dlouhý 1 - 2,5mm, je tupý a bílý. Květenství je převislé, tvořené vejčitými klásky, plevy jsou zelené a mají pinavě fialové pruhy. Patří mezi ohrožené druhy C3.

Vyhovuje ji listnaté lesy, doubravy a suťovité.

Melica poecilantha

synonyma: *M. poecilantha* var. *umbrosa*

Melica porteri

synonyma: *M. mutica* var. *parviflora*, *M. parviflora*, *M. porteri* var. *laxa*, *M. stricta*

oblasti: Arizona, Kansas, Kolorado, Nové Mexiko, Texas, Utah

Melica przewalskyi

synonyma: *M. polyantha*

Melica racemosa

synonyma: *M. bolusii*, *M. brevifolia*, *M. caffrorum*, *M. caffrorum* var. *elatior*, *M. decumbens* var. *racemosa*, *M. ovalis*, *M. pumila*

Melica radula

synonyma: *M. scabrosa* var. *radula*, *M. sinica*

Melica rectiflora

Melica rigida

synonyma: *M. aurantiaca* f. *pallida*, *M. aurantiaca* var. *rigida*

Melica riograndensis

Melica sarmentosa

synonyma: *M. sarmentosa* subsp. *cymbaria*, *M. sarmentosa* var. *monticola*, *M. sarmentosa* var. *pilosula*

Melica scaberrima

synonyma: *Festuca scaberrima*, *Glyceria scaberrima*, *Schedonorus bromoides*

oblasti: Chajbar Paštúnchwá, Himálaj, S Indie

Roste v Pákistánu, Himálaji a Indii jako vzpřímená nebo vystoupavá trvalka. Dorůstá výšky 0,5 - 1,5 (i 1,85)cm. Pod zemí vytváří oddenek. Listy jsou čárkovité, dlouhé 15 - 35cm a široké 3 - 5,5mm. Květenstvím je lata délky 20 - 40cm, větve jsou vystoupavé, dlouhé 6 - 15cm, klásky jsou podlouhlé a dlouhé 0,85 - 1,3cm.

Melica scabra

synonyma: *M. cajamarcensis*, *M. cajamarcensis* f. *densa*, *M. majuscula*, *M. majuscula* var. *glabra*, *M. pallida*, *M. pyrifera*, *M. scabra* f. *pubescens*, *M. scabra* var. *glabra*, *M. scabra* var. *pubescens*, *M. weberbaueri*, *M. weberbaueri* var. *decolorata*, *M. weberbaueri* var. *pilosula*, *M. weberbaueri* var. *violascens*

Melica scabrosa

synonyma: *M. scabrosa* var. *limprichtii*, *M. scabrosa* var. *potaninii*, *M. scabrosa* var. *puberula*

Melica schafkatii

Melica schuetzeana

Melica secunda

synonyma: *M. gracilis*, *M. munroi*, *M. secunda* var. *interrupta*, *M. spinosa*

oblasti: Afganistán, Kašmír, Pákistán, Tádžikistán, Čína

Roste v Kašmíru, Tádžikistánu, Čínské Číne a Afganistánu jako vzpřímená trvalka. Dorůstá výšky do 60cm. Pod zemí vytváří oddenek. Listy jsou čárkovité, dlouhé do 17cm a široké 1,5 - 2mm. Květenstvím je lata délky do 15cm, klásky jsou široce vejčité a dlouhé 7 - 8mm.

Melica serrana

Melica smithii

synonyma: *Avena smithii*, *Bromelica smithii*, *M. retrofracta*, *Schizachne smithii*

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Idaho, Jižní Dakota, Michigan, Montana, Ontario, Oregon,

Quebec, Washington, Wisconsin, Wyoming

Melica spartinoides

Melica spectabilis

synonyma: Bromelica spectabilis, M. bulbosa var. spectabilis, M. scabrata

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Pochází ze západu Severní Ameriky. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 10 - 100cm.

Melica stricta

synonyma: M. stricta var. albicaulis

oblasti: Kalifornie, Nevada, Oregon, Utah

Pochází ze západu USA. Dorůstá výšky 10 - 90cm.

Melica stuckertii

synonyma: M. cordobensis, M. stuckertii var. cordobensis

Melica subflava

synonyma: M. flava, M. qinghaiensis

Melica subulata

synonyma: Bromelica subulata, Bromus subulatus, Festuca acerosa, M. acuminata, M. pammelii, M. poioides var. acuminata, M. subulata var. pammelii

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Oregon, Washington, Wyoming

Pochází ze západu Severní Ameriky. Dorůstá výšky do 1,3m. Délka klásků je asi 3cm.

Melica tangutorum

Melica taylorii

Melica teneriffae

Melica tenuis

Melica tibetica

Melica torreyana

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie. Délka klásků nepřesahuje 1cm.

Melica transsilvanica (Strdivka sedmihradská)

synonyma: M. altissima var. transsilvanica, M. ciliata subsp. transsilvanica, M. ciliata var. lobata, M. ciliata var. transsilvanica, M. interrupta, M. lobata, M. transsilvanica subsp. klokovii

oblasti: Česká republika, Írán, Itálie, Německo, Polsko, Rumunsko

Pochází z jihozápadní Evropy s přesahem do střední. Roste v trsech. Dorůstá výšky 90cm. Pochvy dolních listů jsou hustě dlouze ochlupené, čepele jsou nesvinuté, kýlnaté, zelené, časem se stáčí a ochabují, pochvy dolních listů jsou dlouze ochlupené a jazýčky jsou dlouze zašpičatělé. Klásky mají hnědobéžovou barvu a tvoří hustý lichoklas. Patří mezi chráněné druhy C4. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. klokovii
- 'Red Spire'
- subsp. transsilvanica

Vyhovuje ji teplo, suché kamenité stráně, stepi a meze na plném slunci.

Melica turczaninowiana

synonyma: M. gmelinii

Melica uniflora (Strdivka jednokvětá)

synonyma: Dalucum lobelianum, M. lobelii, M. nutans, M. uniflora f. glabra, M. uniflora var. leiophylla

oblasti: Česká republika, Írán, Irsko, Itálie, Katalánsko, Německo, Polsko

Dorůstá výšky 30 - 50cm. Proti jazýčku je špičatý 3 - 4mm dlouhý přívěsek. Květenstvím je volná lata složená ze samostatných přímých klásků s jedním fertilním a 1 sterilním květem, spodní větve laty jsou dlouhé a odstálé. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Vareigata' - bílý pruh na listech

Vyhovuje ji stín v listnatých lesích, zarostlých sutích, atp. s půdou bohatou na živiny.

Melica violacea

synonyma: M. alata, M. alata var. filiculmis, M. alata var. mollis, M. filiculmis, M. laxiflora, M. valdiviana, M. violacea f. mollis

Melica virgata

synonyma: *M. nodosa*

Melica x aschersonii

Melica x ceretana

Melica x thuringiaca

Melica x weinii

Melica yajiangensis

Další informace:

<http://botany.cz/cs/melica-nutans/>

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Strdivka>

<http://www.agrostis.cz/?pg=atlas-trav-38>

<http://www.floracr.unas.cz/floraCR/strdivka.htm>

<http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=568>

<https://www.rostliny.net/>