

# Pteridium (Hasivka)

čeleď: Dennstaedtiaceae

Dorůstá výšky obvykle 0,6 - 2 (i 2,5)m. Patří mezi trvalky, ale listy na zimu shazuje. Pod listy se nacházejí výtrusnice. Nejznámější druhem je *P. aquilinum*.

Velmi rychle se rozrůstá a to v řádech metrů.

## Pteridium aquilinum (Hasivka orličí)

oblasti: Alabama, Albánie, Alberta, Aljaška, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arkansas, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Česká republika, Čína, Dánsko, Delaware, Estonsko, Finsko, Florida, Francie, Georgia, Gruzie, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Izrael, Jižní Dakota, Jižní Karolína, JZ Rusko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kavkaz, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Litva, Lotyšsko, Louisiana, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Makedonie, Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Moldávie, Montana, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Palestina, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Severní Dakota, Severní Karolína, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Střední Asie, Sýrie, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Utah, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Z Rusko, Západní Virginie

Cirkumboreální. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,5 - 2m a stala se tím nejvyšší evropskou kapradinou. Má plazivý dlouhý, článkovaný, zploštělý, hustě ochlupený až 1,2cm tlustý oddenek. Listy jsou 2 - 3x zpeřené, kožovité, v obrysu široce 3úhlé, dlouhé (0,2 -) 1 - 1,5 (i 2)m s až 1m žlábkovaným řapíkem a s celkovým 3úhlým nebo vejčitým tvarem, okraje podvinuté, na zimu opadají a v mládí jsou svinuté. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *decompositum*
- subsp. *pinetorum*/*P. pinetorum*

Vyhovují ji chudé písčité kyselé půdy a světlé stanoviště bez přímého poledního slunce a zejména borové lesy.

Množí se dělením.

## Pteridium arachnoideum

synonyma: *P. aquilinum* var. *arachnoideum*

oblasti: Portoriko

## Pteridium caudatum

synonyma: *P. aquilinum* subsp. *caudatum*, *P. aquilinum* var. *caudatum*

oblasti: Florida, Portoriko

### Pteridium esculentum

### Pteridium latiusculum

### Pteridium oehningense (Hasivka öhningenská)

oblasti: Česká republika, Francie, Německo, Švýcarsko

Již vyhynulý druh.

### Pteridium tauricum (Hasivka krymská)

oblasti: Arménie, Kavkaz, Krym

Další informace:

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Pteridium\\_aquilinum](http://cs.wikipedia.org/wiki/Pteridium_aquilinum)

<http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/pteridium/>

<http://kvetiny.atlasrostlin.cz/hasivka-orlici>

<http://prirodakarlovarska.cz/?clanky/hasivka-orlici-pteridium-aquilinum-l>

<http://www.floracr.unas.cz/floraCR/hasivka.htm>

<http://www.garten.cz/a/cz/2728-pteridium-aquilinum-hasivka-orlici/>

<https://www.rostliny.net/>