

Rothea

čeleď: Lamiaceae

Roste v tropické Asii a subsaharské Africe v podobě keře (i šplhavého), polokeře, trvalky, několik druhů i jako liány nebo malé stromy. Listy jsou vstřícné nebo přeslenité nebo křížmostojné, zpravidla zubaté a krátce řapíkaté. Kvete modrými, růžovořialovými nebo bílými (i žlutými) 5četnými květy a 4mi dlouhými tyčinkami. Plodem je 3 - 4laločná peckovice. Nejznámějším druhem je *R. myricoides*.

Rothea alata

synonyma: *Clerodendrum alatum*, *Clerodendrum alatum* var. *floribundum*, *Clerodendrum fleuryi*, *Clerodendrum hexagonum*, *Clerodendrum lelyi*, *Clerodendrum myricoides* var. *floribundum*

Rothea amplifolia

synonyma: *Clerodendrum amplifolium*

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe. Listy jsou široce vejčité, špičaté, konce vykrajované až zubaté, ochlupené, dlouhé 12 - 15cm, široké 7 - 8cm, báze zakulacená a řapíky dlouhé 1cm, u báze čepele okřídlené. Květenstvím je bohatý stopkatých vrcholík délky 8cm, vlastní květy mají zvonkovitý kalich a tyčinky přesahující o 3cm.

Rothea aurantiaca

synonyma: *Clerodendrum aurantiacum*, *Clerodendrum macrostachyum*

Rothea bukobensis

synonyma: *Clerodendrum bukobense*, *Clerodendrum variifolium*

Rothea caerulea

synonyma: *Clerodendrum caeruleum*

Rothea calundensis

synonyma: *Clerodendrum calundense*

Rothea commiphoroides

synonyma: *Clerodendrum commiphoroides*

Rothea cuneiformis

synonyma: *Clerodendrum cuneatum*, *Clerodendrum cuneiforme*, *Clerodendrum scheffleri* var. *ellipticum*

Rothea cyanea

synonyma: *Clerodendrum cyaneum*

Rothea farinosa

synonyma: *Clerodendrum farinosum*, *Clerodendrum farinosum* var. *pubescens*, *Clerodendrum venosum*, *Clerodendrum venosum* var. *pubescens*, *Volkameria farinosa*

Rothea hirsuta

synonyma: *Clerodendrum hirsutum*, *Clerodendrum hirsutum* var. *ciliatum*, *Clerodendrum pearsonii*, *Clerodendrum triphyllum* f. *hirsutum*, *Clerodendrum triphyllum* var. *ciliatum*, *Cyclonema hirsutum*

Rothea incisa

synonyma: *Clerodendrum bernieri*, *Clerodendrum dalei*, *Clerodendrum incisum*, *Clerodendrum incisum* var. *afzelii*, *Clerodendrum incisum* var. *longipedunculatum*, *Clerodendrum incisum* var. *macrosiphon*, *Clerodendrum incisum* var. *vinosum*, *Clerodendrum macrosiphon*

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě keře. Dorůstá výšky 0,5 - 3m. Listy jsou zašpičatělé, holé či drsné, dlouhé 4 - 16cm, široké 1,5 - 7cm, laločnaté až zastříhované (i celokrajné), laloky špičaté a báze protažená. Květenstvím je 3 - 10tičetná lata, vlastní květy jsou bílé, trubka má délku 5 - 7,5cm a laloky jsou dlouhé 1 - 1,5cm.

Rothea kissakensis

synonyma: *Clerodendrum kissakense*, *Clerodendrum kissakense* var. *rovumense*

Rothea louwalbertsii

synonyma: *Clerodendrum louwalbertsii*

Rothea luembensis

synonyma: *Clerodendrum luembense*, *Clerodendrum milne-redheadii*

Rothea makanjana

synonyma: *Clerodendrum makanjanum*

Rothea mendesii

synonyma: *Clerodendrum mendesii*

Rothea myricoides

synonyma: *Clerodendrum dekindtii*, *Clerodendrum dekindtii* var. *dinteri*, *Clerodendrum myricoides*, *Clerodendrum myricoides* f. *lanceolatilobatum*, *Clerodendrum myricoides* var. *camporum*, *Clerodendrum myricoides* var. *chartaceum*, *Clerodendrum myricoides* var. *grossiserratum*, *Clerodendrum myricoides* var. *involutum*, *Clerodendrum myricoides* var. *laxum*, *Clerodendrum*

myricoides var. microphyllum, Clerodendrum myricoides var. savanorum, Clerodendrum neumayeri, Clerodendrum savanorum, Clerodendrum schlechteri, Clerodendrum sylvaticum, Clerodendrum ugandense, Cyclonema myricoides, Cyclonema sylvaticum, Cyrtostemma myricoides, R. myricoides f. lanceolatilobata, Siphonanthus myricoides, Spironema myricoides

oblasti: Angola, Eritrea, Etiopie, Jihoafrická Republika (JAR), Keňa, Mosambik, Namibie, Tanzánie

Pochází z Afriky. Roste v podobě keře nebo polokeře (občas i téměř liány). Dorůstá výšky do 4m. Stonky mohou být krátce ochlupené. Listy jsou vstřícné neb seskupené do 3 - 4četných přeslenů, zelené, obkopynaté až obvejčité, lesklé, tupě špičaté, báze klínovitá, dlouhé 1,5 - 15cm, široké 0,5 - 9cm, okraj může být celokrajný až zubatý, povrch může být plstnatý, žilnatina je na horní straně mírně propadlá, spodní strana bývá žláznatě tečkovaná a řapíky jsou krátké. Kvete v řídké terminální latě, světle modrofialovými 5tičetnými květy, korunní lístky jsou modré až růžovofialové (i nazelenalé s 1 modrým lalokem či modré s 2mi bílými laloky) obvejčité, spodní je protažený, kalich je červený, dlouhý do 1cm. Plodem je černá 4laločná peckovice délky 1cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Ugandense'/'Blue Butterfly' - dorůstá výšky 0,9 - 1,5 (i 3)m; listy lesklé, tmavězelené, obvejčité, pilovité a dlouhé do 10cm; terminální lata; květy v odstínech modré, 1 korunní lístek bývá fialový, ostatní 4 světlé

Vyhovuje ji plné slunce, křovinaté svahy a občas i duny.

Rothea pilosa

synonyma: Clerodendrum pilosum

Rothea prittwitzii

synonyma: Clerodendrum prittwitzii

Rothea quadrangulata

synonyma: Clerodendrum attenuatum, Clerodendrum myricoides var. attenuatum, Clerodendrum quadrangulatum

Rothea reflexa

synonyma: Clerodendrum reflexum

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe v podobě keře nebo stromu. Listy jsou dlouhé 4 - 14cm, široké 2 - 5cm, ochlupené, špičaté, na okraji hluboce zubaté (až 15 párů zubů) (i celokrajné) a řapíky jsou dlouhé do 1,2cm. Květy samostatnými květy nebo v několikačetných terminálních vrcholcích s délkou do 9cm, vlastní květy mají 4 bílé až namodralé korunní lístky, 5. spodní lalok bývá růžovofialový.

Rothea rupicola

synonyma: Clerodendrum rupicola

Rothea sansibarensis

synonyma: *Clerodendrum sansibarense*, *Clerodendrum sansibarense* f. *tomentellum*, *Clerodendrum scheffleri*, *Clerodendrum varium*, *R. sansibarense* f. *tomentella*

oblasti: Zanzibar

Roste v Africe v podobě keře, který může být i popínavý. Dorůstá výšky 2 - 6m. Listy jsou mírně vejčité, zašpičatělé, celokrajné či vroubkované, dlouhé 4 - 21cm, široké 2 - 11cm a mohou být řídce ochlupené. Kvete v paždí listů ve vidlanovitých pyramidálních vrcholících o délce do 20cm, šířce do 50cm tvořenými nazelenalými květy s 1 načervenalým nebo modrozeleným lalokem, trubka má délku 0,8 - 1cm, stejně tak i laloky. Plodem je temně červená zploštělá peckovice délky 6 - 7mm a šířky 0,7 - 1,1cm.

Rothea serrata

synonyma: *Clerodendrum bracteosum*, *Clerodendrum cuneatum*, *Clerodendrum divaricatum*, *Clerodendrum grandifolium*, *Clerodendrum herbaceum*, *Clerodendrum javanicum*, *Clerodendrum macrophyllum*, *Clerodendrum ornatum*, *Clerodendrum serratum*, *Clerodendrum serratum* f. *lacteum*, *Clerodendrum serratum* var. *amplexifolium*, *Clerodendrum serratum* var. *glabrescens*, *Clerodendrum serratum* var. *herbaceum*, *Clerodendrum serratum* var. *nepalense*, *Clerodendrum serratum* var. *obovatum*, *Clerodendrum serratum* var. *pilosum*, *Clerodendrum serratum* var. *velutinum*, *Clerodendrum serratum* var. *wallichii*, *Clerodendrum ternifolium*, *Clerodendrum trifoliatum*, *Cyclonema serratum*, *Ovieda bracteosa*, *R. bicolor*, *R. ternifolia*, *Volkameria herbacea*, *Volkameria serrata*

oblasti: Malajsie, Srí Lanka, V Indie

Roste v Malajsii, Indii a na Srí Lance v podobě keře. Dorůstá výšky do 2,4m. Stonky mají čtvercový průřez. Listy jsou vstřícné, oválné, pilovité, holé, báze je kulatá a mají řapíky. Květenstvím je pyramidální lata délky do 25cm, je tvořená 5tičetnými namodralými květy, kde spodní lístek je protažený a sytěji modrý. Plodem je 4laločná peckovice černé barvy.

Rothea suffruticosa

synonyma: *Clerodendrum discolor* var. *verbascifolium*, *Clerodendrum suffruticosum*, *Clerodendrum suffruticosum* var. *natalense*

Rothea taborensis

synonyma: *Clerodendrum taborense*

Rothea tanneri

synonyma: *Clerodendrum tanneri*

Rothea teaguei

synonyma: *Clerodendrum teaguei*

Rothea vanprukii

synonyma: *Clerodendrum vanprukii*

Rothea verdcourtii

synonyma: *Clerodendrum verdcourtii*, *Clerodendrum violaceum*

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe v podobě keře s výškou 2 - 6m nebo i stromu s výškou do 10m. Borka je šedá až hnědá a drsná. Listy jsou vstřícné, eliptické až téměř okrouhlé, špičaté, dlouhé 4,5 - 14cm, široké 2 - 9cm, báze zakulacená, okraj zubatý až téměř celokrajný a řapíky jsou dlouhé 1 - 3cm. Kvete po 1 - 5ks ve vrcholících složených v terminální latu délky do 5cm, korunní lístky jsou bleděmodré, centrální tmavěmodrý až narůžovofialovělý (i bílý) a kališní lístky jsou dlouhé 3úhlé. Plody jsou 3 - 4laločné a velké 0,8 - 1cm.

Rothea violacea

synonyma: *Clerodendrum cabrae*, *Clerodendrum indeniense*, *Clerodendrum kalbreyeri*, *Clerodendrum noiroti*, *Clerodendrum variifolium* var. *scandens*, *Clerodendrum violaceum*

Rothea wildii

synonyma: *Clerodendrum wildii*

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 5m. Borka je šedohnědá, hladká až korkovitá. Větve jsou kulatě 4hranné a mají na sobě jizvy po opadlých listech. Listy jsou eliptické, holé, oboustranně zúžené, na okraji hrubě zubaté, dlouhé 3 - 9cm, široké 1,5 - 5,5cm, centrální žilka na spodní straně vyniklá, žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,2 - 1cm. Kvete v terminálních bohatých květenstvích s délkou 4 - 10cm, vlastní květy mají ochlupenou korunu, laloky zelenobílé, na okraji nafialovělé a jeden z nich je celý tmavěfialový. Plody jsou 4laločné, dlouhé i široké 1 - 1,5cm, dužnaté, černé a obsahují 4 semena.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/rothea-myricoides/>

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=3479>

<https://www.rostliny.net/>