

Attalea

synonyma: Bornoa, Englerophoenix, Ethnora, Heptantra, Lithocarpos, Markleya, Maximiliana, Orbignya, Orbignyia, Parascheelea

čeleď: Arecaceae

Roste v Mexiku, střední Americe včetně karibiku a Jižní Americe v podobě jednodomé palmy. Kmínky jsou poléhavé nebo vzpřímené, obvykle pokryté odumřelými bázemi listů. Listy jsou zpeřené, řapíky mohutné, bleděhnědé, šedé nebo žluté a lístky jsou úzce kopinaté. Květenství je velké, listeny dřevnaté, vlastní květy bývají buď pouze samčí anebo z větší části samičí. Plody obsahují několik semen.

Vyžaduje plné slunce.

Attalea allenii

oblasti: Kolumbie, Panama

Roste v Panamě a Kolumbii. Kmeny jsou krátké, ukryté pod zemí. Listy vyrůstají po 8 - 15ti ks, jsou zpeřené, mají délku 4,5m a vlastní lístky jsou asymetricky seskupené do svazků. Květenství má krátkou stopku, samčí mají 6 tyčinek. Plody jsou obvejčité, bleděhnědé, dlouhé 6 - 8cm, v průměru mají 3,5 - 5cm a obsahují 1 - 3 semena

Attalea amygdalina

synonyma: A. uberrima, A. victoriana

oblasti: Kolumbie, S Andy

Roste v Andách Kolumbie. Kmen je krátký, podzemní. Listy vyrůstají po 10 - 15ti ks, mají délku do 5,5m, vlastní lístky jsou tmavězelené, úzce eliptické, dlouhé do 90cm a široké 3cm. Květenství je stopkaté, samčí mají 6 - 22 tyčinek. Plody jsou úzce obvejčité, dlouhé 6 - 9cm a průměru mají do 5cm.

Attalea amylacea

synonyma: Scheelea amylacea

Attalea anisitsiana

synonyma: A. parviflora, Scheelea anisitsiana, Scheelea parviflora, Scheelea quadrisperma, Scheelea quadrisulcata

Attalea apoda

synonyma: A. camposportoana

Attalea attaleoides

synonyma: *A. transitiva*, *Englerophoenix attaleoides*, *Maximiliana attaleoides*

oblasti: Brazílie, Francouzská Guyana

Roste ve Francouzské Guyaně a Brazílii. Kmeny jsou krátké a podzemní. Listy vyrůstají po 8 - 11 ks. Listy jsou zpeřené, dlouze řapíkaté, vlastní lístky asymetrické. Květenství je krátce stopkaté, vzpřímené, samčí květy mají čárkovité korunní lístky a 6 tyčinek. Plody jsou úzce vejčité, dlouhé 4,5 - 5,5cm, v průměru mají 2 - 2,5cm a obsahují 2 - 3 semena.

Attalea barreirensis

Attalea bassleriana

synonyma: *Scheelea bassleriana*, *Scheelea brachyclada*, *Scheelea stenorhyncha*

Attalea blepharopus

synonyma: *Scheelea blepharopus*

Attalea brasiliensis

oblasti: Brazílie

Attalea brejinhoensis

synonyma: *Orbignya brejinhoensis*

Attalea burretiana

synonyma: *A. concentrista*

Attalea butyracea

synonyma: *A. gomphococca*, *A. humboldtiana*, *A. macrocarpa*, *A. pycnocarpa*, *A. wallisii*, *Cocos butyracea*, *Scheelea butyracea*, *Scheelea dryanderæ*, *Scheelea excelsa*, *Scheelea gomphococca*, *Scheelea humboldtiana*, *Scheelea macrocarpa*, *Scheelea passargei*, *Scheelea regia*, *Scheelea wallisii*

oblasti: Jižní Amerika, Střední Amerika

Roste ve Střední a Jižní Americe. Kmen dorůstá výšky 3 - 20m při průměru 25 - 50cm. Na povrchu bývají zbytky po odumřelých listech. Listy vyrůstají po 15 - 35ks, jsou zpeřené, bývají ohnuté, řapíky mohou i chybět, vlastní lístky jsou symetrické. Květenství samčích listů má čárkovité korunní lístky a 6 tyčinek. Plody jsou dlouze vejčité, oranžové, žluté nebo hnědé, dlouhé 4,5 - 8,5cm, široké 3 - 4,5cm a obsahují 1 - 3 semena.

Attalea camopiensis

synonyma: *Scheelea camopiensis*

Attalea cephalotus

synonyma: Scheelea cephalotes

Attalea cohune

synonyma: Orbignya cohune, Orbignya dammeriana

oblasti: Belize, Guatemala, Honduras, Mexiko, Salvador

Roste od Mexika po Honduras a Belize. Kmen dorůstá výšky 6 - 20m při průměru 30 - 60cm. Listy vyrůstají po 15 - 30ti ks a vlastní lístky jsou symetrické. Květenství samčích květů má ohnuté korunní lístky s max. 24mi tyčinkami. Plody jsou úzce vejčité, hnědé až žlutohnědé, dlouhé 4 - 8cm, široké 3,3 - 4,5cm a obsahují 1 - 3 semena.

Attalea colenda

synonyma: Ynesa colenda

oblasti: Ekvádor, Kolumbie

Roste v Kolumbii a Ekvádoru. Kmeny dorůstají výšky do 30m při průměru 30 - 50cm. Listy vyrůstají po 15 - 25ks, jsou zpeřené a vlastní lístky symetrické. Květenství samčích květů má 10 - 11 tyčinek. Plody jsou oranžovohnědé, dlouhé do 6cm, široké 3,5cm a obsahují 1 - 3 semena.

Attalea compta

Attalea crassipatha

synonyma: Bornoa crassipatha, Cocos crassipatha, Maximiliana crassipatha, Orbignya crassipatha

oblasti: Hispaniola

Roste na Hispaniole. Kmen dorůstá výšky do 20m při průměru do 35cm. Listy vyrůstají po 15 - 19ti ks, jsou dlouhé 3 - 3,6m, zpeřené, vlastní lístky symetrické a vřeteno je na konci zkroucené. Květenství má krátkou stopku, samčí květy mají čárkovité korunní lístky a 8 - 9 tyčinek. Plody jsou načervenalé, vejčité, dlouhé 3,5 - 4cm, široké 2cm a obsahují 1 semeno.

Attalea cuatrecasana

synonyma: Orbignya cuatrecasana

oblasti: Ekvádor, Kolumbie

Roste v Kolumbii a Ekvádoru. Kmeny jsou krátké a podzemní. Listy vyrůstají po 6 - 10ti ks, jsou zpeřené a vlastní lístky symetrické. Květenství samčích květů má zahnuté korunní lístky a 20 - 24 tyčinek. Plody jsou kulovité, dlouhé 11 - 14cm, široké 7,5 - 9,5cm a obsahují 1 - 3 semena.

Attalea dahlgreniana

synonyma: Markleya dahlgreniana, Maximbignya dahlgreniana

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii. Kmeny mohou být i plazivé, mají délku 2 - 15m a průměr 30 - 55cm. Listy vyrůstají po 12 - 20ti ks, jsou zpeřené a vlastní lístky symetrické. Květenství má dlouhou stopku, samčí květy mají korunní lístky zakřivené a mají 7 - 10 tyčinek. Plody jsou eliptické, nahnědlé, dlouhé 6 - 9cm, široké 2,5 - 4cm a obsahují 1 - 3 semena.

Attalea degranvillei

synonyma: Scheelea degranvillei

Attalea dubia

synonyma: A. concinna, A. indaya, Desmoncus dubius, Orbignya dubia, Pindarea concinna, Pindarea dubia, Pindarea fastuosa, Scheelea dubia

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii. Kmen dorůstá výšky 5 - 25m při průměru kmene 20 - 35cm. Listy vyrůstají po 35ks, vlastní lístky jsou symetrické a seskupené do svazků. Květenství má dlouhou stopku a samčí mají 6 - 9 tyčinek. Plody jsou podlouhlé, dlouhé 6 - 6,5cm, široké 3cm a obsahují 1 - 2 semena.

Attalea eichleri

synonyma: Orbignya campestris, Orbignya eichleri, Orbignya humilis, Orbignya longibracteata, Orbignya macrocarpa, Orbignya urbaniana

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii. Kmeny jsou podzemní, dlouhé do 1,5m. Listy vyrůstají po 4 - 8ks, jsou zpeřené, lístky asymetricky uspořádané ve svazečcích. Květenství má krátké stopky, samčí mají zakřivené korunní lístky a 17 - 20 tyčinek. Plody jsou eliptické, dlouhé 7 - 8cm, široké 4 - 5,5cm a obsahují 3 - 5 semen.

Attalea exigua

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii. Kmeny jsou krátké a podzemní. Listy vyrůstají po 4 - 8mi ks, jsou obloukovité, vlastní lístky seskupené do svazečků. Květenství je krátce stopkaté, samčí mají 6 - 9 tyčinek. Plody jsou obvejčité, červené, oranžové až tmavě růžovofialové, dlouhé 4 - 6cm, v průměru mají 3 - 5,5cm a obsahují 1 - 2 semena.

Attalea fairchildensis

synonyma: Scheelea fairchildensis

Attalea funifera

synonyma: A. acaulis, Lithocarpus cocciformis, Sarinia funifera

oblasti: V Brazílie

Roste v Brazílii. Kmen má výšku do 15m a průměr 30cm. Listy vyrůstají po 5 - 15ti ks, jsou tmavězelené, dlouze řapíkaté, vlastní lístky asymetrické. Květenství je dlouze stopkaté, samčí mají 6 tyčinek. Plody jsou mírně obvejčité, dlouhé 10 - 15cm, široké 3 - 9cm a obsahují 1 - 3 semena.

Attalea geraensis

synonyma: A. guaranitica, A. monogyne

oblasti: Brazílie, Paraguay

Roste v Brazílii a Paraguayi. Kmeny jsou krátké a podzemní. Listy vyrůstají po 4 - 8ks, jsou zpeřené, vlastní lístky symetrické. Květenství je krátce stopkaté a samčí mají 6 - 10 tyčinek. Plody jsou obvejčité až vejčité, červenohnědé, dlouhé 5 - 7cm, široké 3 - 4,5cm a obsahují 1 - 6 semen.

Attalea guacuyule

synonyma: Cocos cocoyule, Cocos guacuyule, Orbignya guacuyule

Attalea guianensis

synonyma: Scheelea guianensis

oblasti: SV Jižní Amerika

Attalea hoehnei

Attalea huebneri

synonyma: Scheelea huebneri

Attalea humilis

synonyma: A. borgesiana, A. butyrosa, A. compta var. acaulis, Cocos butyrosa

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii. Kmínky jsou podzemní, dlouhé do 1m. Listy vyrůstají 4 - 15ks, vlastní lístky jsou dlouhé 3 - 4,5m, vlastní lístky jsou symetrické. Květenství je krátce stopkaté a samčí mají 6 tyčinek. Plody jsou obvejčité, nahnědlé, dlouhé 4 - 9cm, široké 2,5 - 8cm a obsahují 1 - 3 semena.

Attalea iguadummat

oblasti: Panama

Roste v Panamě. Kmeny jsou krátké a podzemní. Listy vyrůstají po 9 - 17ti ks, zpeřené a vlastní lístky jsou symetrické. Květenství je krátce stopkaté, samčí mají čárkovité korunní lístky a 8 - 10 tyčinek. Plody jsou obvejčité, dlouhé 7 - 10cm, široké 4,5 - 6,3cm a obsahují 1 - 3 semena.

Attalea insignis

synonyma: *A. goeldiana*, *Cocos insignis*, *Englerophoenix insignis*, *Maximiliana insignis*, *Scheelea attaleoides*, *Scheelea goeldiana*, *Scheelea insignis*

oblasti: Brazílie, Ekvádor, Kolumbie, Peru

Roste v Kolumbii, Ekvádoru, Peru a Brazílii. Kmeny jsou krátké a podzemní. Listy vyrůstají po 9 - 11ti ks. Listy mají řapíky délky 1,6 - 3,3m, čepel je zpeřená, dlouhá až 6m, vlastní lístky asymetrické a seskupené do svazků. Květenství je vzpřímené, dlouze stopkaté, později převislé, samčí květy mají čárkovité korunní lístky a 6 tyčinek. Plody jsou eliptické, dlouhé 7 - 7,5cm, v průměru mají 3,5 - 4cm a obsahují 2 - 3 semena.

Attalea kewensis

synonyma: *Scheelea kewensis*

Attalea lauromuelleriana

synonyma: *Scheelea lauromuelleriana*

Attalea leandroana

synonyma: *Scheelea leandroana*

Attalea luetzelburgii

synonyma: *Orbignya luetzelburgii*, *Parascheelea anchistropetala*, *Parascheelea luetzelburgii*

oblasti: Brazílie, Kolumbie, Venezuela

Roste v Brazílii, Kolumbii a Venezuele. Kmeny jsou krátké a podzemní. Listy vyrůstají po 6ti ks, jsou zpeřené a vlastní lístky symetrické. Květenství je krátce stopkaté, samčí mají čárkovité korunní lístky a 6 tyčinek. Plody jsou vejčité, dlouhé 5 - 5,5cm, široké 2 - 2,5cm a obsahují 1 semeno.

Attalea macrolepis

synonyma: *Scheelea macrolepis*

Attalea magdalenica

synonyma: *Scheelea magdalenica*

Attalea maracaibensis

synonyma: *Scheelea maracaibensis*

Attalea maripa

synonyma: *A. cryptanthera*, *A. macropetala*, *A. regia*, *Englerophoenix caribaeum*, *Englerophoenix longirostrata*, *Englerophoenix maripa*, *Englerophoenix regia*, *Englerophoenix tetrasticha*, *Ethnora maripa*, *Maximiliana caribaea*, *Maximiliana elegans*, *Maximiliana longirostrata*, *Maximiliana macrogyne*, *Maximiliana macropetala*, *Maximiliana maripa*, *Maximiliana martiana*, *Maximiliana regia*, *Maximiliana stenocarpa*, *Maximiliana tetrasticha*, *Palma maripa*, *Scheelea maripa*, *Scheelea*

tetrasticha, Temenia regia

oblasti: Brazílie, Ekvádor, Kolumbie, Peru, Venezuela

Roste v Kolumbii, Venezuele, Ekvádoru, Peru a Brazílii. Kmeny jsou dlouhé 3,5 - 24m a v průměru mají 0,2 - 1m. Listy vyrůstají po 10 - 22ks, jsou zpeřené, vlastní lístky jsou asymetrické a seskupené do svazečků. Květenství má dlouhou stopku, samčí mají kopinaté korunní lístky a 6 tyčinek. Plody jsou nahnědlé, eliptické, dlouhé 4 - 6cm, široké 2,5 - 3cm a obsahují 2 - 3 semena.

Attalea maripensis

synonyma: Scheelea maripensis

Attalea microcarpa

synonyma: A. agrestis, A. polysticha, A. sagotii, Orbignya agrestis, Orbignya microcarpa, Orbignya polysticha, Orbignya sabulosa, Orbignya sagotii

oblasti: Brazílie, Francouzská Guyana, Guyana, Kolumbie, Peru, Venezuela

Roste na severu Jižní Ameriky a v Brazílii. Kmeny jsou krátké a podzemní. Listy vyrůstají po 6 - 16ti ks, jsou zpeřené, vlastní lístky symetrické. Květenství je vzpřímené, samčí mají zakřivené korunní lístky a 9 - 15 tyčinek. Plody jsou vejčité až obvejčité, dlouhé 3,5 - 4cm, široké 2 - 3cm a obsahují 1 - 3 semena.

Attalea moorei

synonyma: Scheelea moorei

Attalea nucifera

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii. Pod zemí vytváří krátké kmeny. Listy vyrůstají po 7 - 13ti ks, jsou zpeřené, vlastní lístky symetrické. Květenství je krátce stopkaté, samčí mají 6 - 7 tyčinek. Plody jsou eliptické, dlouhé 6,5 - 7cm, široké 4 - 5cm a obsahují 2 - 3 semena.

Attalea oleifera

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii. Kmen dorůstá výšky 1,5 - 30m při průměru 30 - 40cm. Listy vyrůstají po 8 - 30ks, jsou zpeřené, vlastní lístky symetrické. Květenství je dlouze stopkaté, samčí má 6 - 9 tyčinek. Plody jsou mírně obvejčité, dlouhé 7 - 11cm, široké 4 - 6cm a obsahuje 1 - 4 semena.

Attalea osmantha

synonyma: Scheelea curvifrons, Scheelea excelsa, Scheelea osmantha, Scheelea urbaniana

Attalea peruviana

synonyma: *Scheelea tessmannii*

oblasti: Peru

Attalea phalerata

synonyma: *A. excelsa*, *A. phalerata* var. *concinna*, *Maximiliana princeps*, *Scheelea corumbaensis*, *Scheelea martiana*, *Scheelea microspadix*, *Scheelea phalerata*, *Scheelea princeps* var. *corumbaensis*

oblasti: Bolívie, Brazílie, Paraguay, Peru

Roste v Brazílii, Bolívii, Paraguayi a Peru. Kmen dorůstá výšky 10 (i 18)m při průměru 25 - 60cm. Listy vyrůstají po 11 - 30ti ks, jsou zpeřené, vlastní lístky asymetrické. Kvete 2x ročně, květenství je dlouze stopkaté, samčí mají čárkovité korunní lístky a 6 tyčinek. Plodit začíná při dosažení výšky 1m (za 7 - 10let), jsou eliptické, dlouhé 6 - 11cm, široké 3 - 5cm a obsahují 1 - 4 semena.

Attalea pindobassu

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii. Kmeny jsou vysoké 5 - 15m a v průměru mají 35 - 50cm. Listy vyrůstají po 15 - 25ti ks, jsou zpeřené, vlastní lístky symetrické. Květenství je dlouze stopkaté a samčí mají 8 - 12 tyčinek. Plody jsou obvejčité, dlouhé 7 - 9cm, široké 4,5 - 6cm a obsahují 1 - 5 semen.

Attalea plowmanii

synonyma: *Scheelea plowmanii*

Attalea princeps

synonyma: *Scheelea princeps*

Attalea racemosa

synonyma: *A. ferruginea*, *Orbignya racemosa*

oblasti: Brazílie, Kolumbie, Peru, Venezuela

Roste v Kolumbii, Venezuele, Peru a Brazílii. Palma může být i trsnatá. Kmeny jsou krátké a podzemní. Listy vyrůstají po 8 - 35ks, jsou zpeřené a symetrické. Květenství je dlouze stopkaté, samčí mají 19 - 42 tyčinek. Plody jsou široce vejčité, dlouhé 6 - 9cm, široké 4,5 - 5cm a obsahují 1 - 2 semena.

Attalea rhynchocarpa

Attalea rostrata

synonyma: *A. liebmannii*, *A. lundellii*, *Cocos regia*, *Scheelea costaricensis*, *Scheelea liebmannii*, *Scheelea lundellii*, *Scheelea preussii*, *Scheelea rostrata*, *Scheelea zonensis*

Attalea salazarii

synonyma: Scheelea salazarii

Attalea salvadorensis

oblasti: Salvador

Attalea seabrensis

Attalea septuagenata

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii. Kmen má výšku 7 - 12m a průměr 25 - 30cm. Listy vyrůstají po 18 - 20ti ks, jsou zpeřené a symetrické. Květenství je dlouze stopkaté, samčí mají 36 - 75 tyčinek. Plody jsou eliptické, dlouhé 10 - 11,5cm, široké 5 - 6cm a obsahují 1 - 2 semena.

Attalea speciosa

synonyma: A. glassmanii, A. lydiae, Heptantra phalerata, Orbignya barbosiana, Orbignya cuci, Orbignya huebneri, Orbignya lydiae, Orbignya macropetala, Orbignya martiana, Orbignya phalerata, Orbignya speciosa

oblasti: Bolívie, Guyana, Maranhao, Surinam

Roste v Brazílii, Guyaně, Surinamu a Bolívii. Kmeny mají výšku 3 - 15m a průměr 25 - 40cm. Listy vyrůstají po 7 - 22ks, jsou zpeřené, vlastní lístky symetrické. Květenství je dlouze stopkaté, později převislé, samčí mají 21 - 56 tyčinek. Plody jsou eliptické, nahnědlé, dlouhé 6,6 - 12,5cm, široké 3,7 - 10cm a obsahují 3 - 6 semen.

Attalea spectabilis

synonyma: A. macoupi, A. monosperma, A. pixuna, A. spectabilis var. monosperma, A. spectabilis var. polyandra, Orbignya pixuna, Orbignya spectabilis

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii. Kmeny jsou krátké a podzemní, dlouhé do 1m. Listy vyrůstají po 8ti ks, jsou zpeřené a symetrické. Květenství je vzpřímené, samčí mají zakřivené korunní lístky a 8 - 15 tyčinek. Plody jsou mírně vejčité, nahnědlé, dlouhé 5 - 6cm, široké 3 - 4cm a obsahují 1 - 2 semena.

Attalea tessmannii

oblasti: Brazílie, Peru

Roste v Brazílii a Peru. Kmeny dorůstají výšky 8 - 20m při průměru 30 - 40cm. Listy vyrůstají po 12ti ks, jsou zpeřené, vlastní lístky asymetrické. Květenství je dlouze stopkaté, samčí palice mají větve délky 25 - 27cm, má 10 - 14 tyčinek, samičí má 2 palice s délkou do 50cm a 5 menších s délkou 13

- 18cm. Plody jsou eliptické, nahnědlé, dlouhé 12 - 13cm, široké 6 - 7cm, zakončené zobákem délky 2 - 2,5cm a obsahují 2 - 3 semena.

Attalea vitrivor

synonyma: Orbignya oleifera

Attalea weberbaueri

synonyma: Scheelea weberbaueri

Attalea wesselsboeri

synonyma: Scheelea wesselsboeri

Attalea x minarum

synonyma: Attabignya minarum

Attalea x piassabossu

Attalea x teixeirana

synonyma: Orbignya x teixeirana

Attalea x voeksii

Další informace:

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=771>

<https://www.rostliny.net/>