

Bongardia chrysogonum

synonyma: Bongardia olivieri, Bongardia rauwolfii

čeleď: Berberidaceae

oblasti: Afganistán, Írán, Izrael, Jordánsko, JV Evropa, Kavkaz, Kypr, Malá Asie (Anatolie), Pákistán, Řecko, S Afrika, Sýrie

Roste od jihovýchodní Evropy po střední Asii jako trvalka. Dorůstá výšky (20 -) 30 - 50 (i 80)cm. Pod zemí vytváří korkovitou kulovitou hlízu průměru 2 - 5cm, ze které vyrůstají 1 - 3 šedozelené lichozpeřené listy s délkou 10 - 20 (i 25)cm s 9 - 17ti úzkými eliptickými přisedlými zubatými (i přeslenitými po 3 - 4ks) listy délky 1,5 - 3cm a šířky 0,6 - 1 (i 1,5)cm a 3 - 5ti zuby na vrcholu. U báze mohou mít růžovofialovou skvrnu. Květenstvím je chudě větvená lata tvořená žlutými 6tičetnými květy délky 1 - 2cm, o průměru 1,2 - 2,5cm na 2 - 5cm stopce, listeny jsou úzce eliptické, dlouhé 4 - 8mm, široké 2 - 3mm, kališní lístky jsou nestejně, vejčité až kulovité, dlouhé 4 - 6mm, korunní lístky jsou vejčité, kopinaté nebo eliptické, dlouhé 0,8 - 1,2cm, široké 3,5 - 5mm a žluté. Plodem je tobolka obsahující 1 - 4 (i 4) černých semen průměru 2 - 3mm.

Vyhovují mu stepi, polopouště, pastviny, kamenitá místa, úpatí skal, atp. s hlubokou půdou na plném slunci.

<https://www.rostliny.net/>